

Standardmeningar till PAKObrev

I det här dokumentet kan du se alla PAKObrev till patient i full text.

Hur du gör för att lägga upp och skicka kan du läsa i manualen

[Brev till patient PAKO](#)

Innehåll

Avbokn	1
DistJ	2
DistN.....	3
Nejort.....	4
S-apné	5
Skuld.....	6
K-blad	7
Uppsök.....	8
UppsPA.....	9
Ubv	10
Ubb	11
ubBBr1	12
ubBBr2	13
Lustgas.....	14
Midazolam.....	15
Narkos Barn.....	16
Narkos Vuxen.....	17
Impl op.....	18
T-kir.....	20
Waran	22

Avbokn -åb utan ny tid kallas senare

Vi måste tyvärr avboka din tid den /.....

I nuläget kan vi inte ge dig någon ny tid men vi kommer att kalla in dig om ca 2-3 månader.

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss

Med vänlig hälsning

Vårdenhet_Namn

Vårdenhet_Adress

Vårdenhet_Telefon

www.norrbotten.se/tandvard

DistJ -Inf om ort visn, distans – ska bli beh

..... har visats för tandregleringsspecialisten och vi kommer att påbörja behandling.

Planerad behandling

.....

Kallelse kommer inom kort för

.....

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss

Med vänlig hälsning

Vårdenhet_Namn

Vårdenhet_Adress

Vårdenhet_Telefon

www.norrbotten.se/tandvard

DistN -Inf om ort visn, distans – blir ingen beh

..... har visats för tandregleringsspecialisten.

För närvarande är ditt behandlingsbehov för litet för att någon behandling ska bli aktuell.

Vi fortsätter att kontrollera din bettutveckling vid ordinarie undersökningar.

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss

Med vänlig hälsning

Vårdenhet_Namn

Vårdenhet_Adress

Vårdenhet_Telefon

www.norrbotten.se/tandvard

Nejort - Info målsman att barnet tackat nej till ort beh

Målsman för

..... pers nr

har erbjudits tandregleringsbehandling vid Folk tandvården
men tackat nej.

Vi vill på detta sätt göra dig uppmärksam på detta och upplysa om att det
finns ett prioriterat vårdbehov som eventuellt på längre sikt kan ge problem
med bettet.

Det är viktigt att känna till att nödvändig tandvård är kostnadsfri för barn och
ungdomar till och med 23 år. Från det år man fyller 24 år måste man själv stå
för kostnaden. Detta gäller även tandregleringsbehandling. I sällsynta fall
kan förlängt vårdansvar gälla, vilket innebär att Landstinget står för kostna-
den. En förutsättning är dock att behandlingen utförs i Norrbotten. Om tand-
regleringsbehandling fördröjs till efter 23 års ålder av skäl som Folk tandvår-
den inte kan lastas för får man räkna med att själv betala den del av behand-
lingen som utförs från och med det år man fyller 24 år. Exempel på sådana
förhållanden kan vara att man tidigare avstått från erbjuden kölisteplats eller
behandling och sedan ändrat sig eller uppskjutit behandling p.g.a. utlandsvis-
telse.

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss

Med vänlig hälsning

Vårdenhet_Namn

Vårdenhet_Adress

Vårdenhet_Telefon

www.norrbotten.se/tandvard

S-apné -Bifogas kallelse efter remiss för apné-skena

Information inför behandling med sömnapnéskena

Vi har fått remiss från hälso- och sjukvården för att utreda dina förutsättningar för att kunna behandlas med en sömnapnéskena (snarkskena).

Om vår utredning visar att du kan behandlas med en skena kommer vi att tillverka en sådan till dig. Skenan används nattetid och styr underkäken till ett läge som ökar möjligheten för fri passage vid andning då du sover.

Besöksavgiften är 300 kronor per besök om din behandling är godkänd av landstingets hälso- och sjukvårdsenhet. Ta med ditt högkostnadsskydd eller frikort om du uppnått frikortsnivån. Hälso- och sjukvårdens högkostnads-skydd gäller även vid denna typ av behandling.

Detta är en behandling som utförs inom ramen för hälso- och sjukvården. Det innebär att din vanliga tandvård fortsättningsvis görs hos din ordinarie tandläkare.

Skuld -Tur för us men skuld

Vid genomgång av kallelser ser vi att du är på tur för undersökning. Tyvärr visar det sig att du även har en oreglerad skuld till landstinget. Detta innebär att du själv får ta ansvaret för att höra av dig till oss för tidsbokning när skulden är reglerad.

I de fall våra uppgifter beträffande ekonomin är felaktiga ber vi dig kontakta oss så att vi får reda ut missförståndet.

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss

Med vänlig hälsning

Vårdenhet_Namn

Vårdenhet_Adress

Vårdenhet_Telefon

www.norrbottn.se/tandvard

K-blad -Info till boende används som kontaktblad

Information om kundens tandvårdsbesök

Utförd behandling:

Vårdplan:

Munvårdsordination:

Övrig information:

Datum för tandvårdskontakt:

Behandlande klinik:

Telefonnummer:

Behandlande tandvårdspersonal:

Uppsök - Rätt till uppsök i hemmet

Du har ett intyg som ger dig rätt till nödvändig tandvård. Det innebär att du kan få tandvård till samma pris som sjukvård. Tandvårdsintyget gäller både på Folktandvården och på privata tandvårdskliniker.

Intyget innebär också att du har möjlighet att få hembesök av en tandhygienist som gör en enkel inspektion med spegel och ficklampa och ger dig råd och anvisningar om hur du bäst sköter dina tänder. En god munhälsa är viktig för att må bra, och det höjer livskvaliteten. Om det finns något som behöver åtgärdas kan du boka tid för detta hos tandvården.

Är du intresserad av ett kostnadsfritt hembesök är du välkommen att kontakta oss inom två veckor.

Vi ser gärna att du kontaktar oss även om du inte är intresserad av erbjudandet.

Tillhör du dem som får hjälp med din omsorg i hemmet av t ex personal, närstående eller annan person är det bra om de kan närvara när vi besöker dig.

Om du inte vill ha ett hembesök har du ändå rätt till nödvändig tandvård. Om det var länge sedan du var hos tandvården eller om du har besvär från munnen kan du kontakta valfri tandvårdsklinik. Uppge då att du har ett tandvårdsintyg. Besöket kostar som ett sjukvårdsbesök. Frikort gäller.

Med vänlig hälsning

Vårdenhet_Namn

Vårdenhet_Adress

Vårdenhet_Telefon

www.norrbotten.se/tandvard

UppsPA - Uppsägning av Frtv avtal

Uppsägning av abonnemang på Frisktandvård

Du har tecknat ett avtal med Folk tandvården Region
Norrbotten

Detta avtal säger vi nu upp på grund av:

- att kliniken inte fått betalt för ditt abonnemang enligt avtal
- att du har uteblivit från överenskomna besök
- att du inte följt överenskommet vårdprogram
- övrigt:

Uppsägningen innebär att avtalet slutar gälla från och med nu.

Uteblivande i tandvård debiteras, för detta uteblivande kommer vi att skicka
en faktura på kr, 50 kr i faktureringsavgift tillkommer

Avanmäl ev. autogiro med Folk tandvården hos Din bank.

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss

Med vänlig hälsning

Vårdenhet_Namn

Vårdenhet_Adress

Vårdenhet_Telefon

www.norrbotten.se/tandvard

Ubv - Uteblivande vuxen

UTEBLIVANDE

från tid hos Folktandvården.....

Du har uteblivit från en bokad tid

Planerad behandling:

Om Du vill boka en ny tid får Du kontakta oss inom 3 v

Om vi inte hör av dig tolkar vi det som att DU inte vill ha någon ny tid och vi skickar inte någon ny kallelse för denna period.

Vi vill också göra dig uppmärksam på att uppehåll i en påbörjad behandling kan förorsaka onödiga skador i munnen.

OBS - Den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården gäller till och med 23 år.

Med vänlig hälsning

Vårdenhet_Namn

Vårdenhet_Adress

Vårdenhet_Telefon

www.norrbotten.se/tandvard

Uteblivande i tandvård debiteras, för detta uteblivande kommer vi att skicka en faktura på kr. 50 kr i faktureringsavgift tillkommer.

Ubb - Uteblivande barn

Till målsman för:

.....

Personnummer:.....

UTEBLIVANDE - från tid hos Folktandvården <Klinik>

..... har uteblivit från en bokad tid

Planerad behandling:

Om du vill boka en ny tid, var vänlig kontakta oss på telefon xxxxxxxxxx inom 3 v.

Om vi inte hör av dig tolkar vi det som att du inte vill ha någon ny tid och vi skickar inte någon ny kallelse för denna period.

Vi vill också göra dig uppmärksam på att uppehåll i en påbörjad behandling kan förorsaka onödiga skador i munnen.

Med vänlig hälsning

Vårdenhet_Namn

Vårdenhet_Adress

Vårdenhet_Telefon

www.norrbotten.se/tandvard

Uteblivande i tandvård debiteras, för detta uteblivande kommer vi att skicka en faktura på kr. 50 kr i faktureringsavgift tillkommer.

ubBBr1 - Upprepade ub barn

Till målsman för:

.....

Personnummer:

Vi har kallat ditt Barn upprepade gånger för behandling.

Ditt barn har tyvärr inte kommit hit och nu är det år sedan vi sågs. Alla barn har rätt till en regelbunden tandvård för att upprätthålla en god tandhälsa med god funktion.

Vänligen meddela oss om ditt barn går till privat tandläkare eller till annan Folktandvårdsklinik.

Beror det på tandvårdsrädsla att ditt barn ej kommit ring för att diskutera så kan vi erbjuda någon lösning för att minska rädslan.

Var snäll och kontakta oss på telefon xxxxxxxxxxx inom 2 veckor

.....

Ansvarig tandläkare

Med vänlig hälsning

Vårdenhet_Namn

Vårdenhet_Adress

Vårdenhet_Telefon

www.norrbotten.se/tandvard

ubBBr2 - Upprepade ub barn, info om anmälningsskyldighet

Till målsman för:

.....

Personnummer:

Vi har kallat ditt Barn upprepade gånger för behandling.

Ditt barn har tyvärr inte kommit hit och nu är det år sedan vi sågs. Alla barn har rätt till en regelbunden tandvård för att upprätthålla en god tandhälsa med god funktion.

Vänligen meddela oss om ditt barn går till privat tandläkare eller till annan Folktandvårdsklinik.

Beror det på tandvårdsrädsla att ditt barn ej kommit ring för att diskutera så kan vi erbjuda någon lösning för att minska rädslan.

Var snäll och kontakta oss på telefon xxxxxxxxxx inom 2 veckor

Enligt Socialstyrelsen är vi annars skyldiga att anmäla detta som ett missförhållande enligt 14 kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453).

.....

Ansvarig tandläkare

Med vänlig hälsning

Vårdenhet_Namn

Vårdenhet_Adress

Vårdenhet_Telefon

www.norrbotten.se/tandvard

Lustgas -innehållet är samma som patientinformation

Lustgas vid tandbehandling

Du har fått en tid för tandbehandling med hjälp av lustgas.

Lustgas är ett välbeprövat avslappnande medel, som gör att du känner dig lugnare och tryggare. Du kommer att andas in en blandning av syrgas och lustgas genom en mask som placeras över näsan. Redan efter ett par minuter märker du att du blir lugn och avslappnad. Du är vaken, kan prata och svara på frågor under hela behandlingen. Lustgas ersätter inte bedövning, men i och med att den ger en lugnande effekt bidrar lustgasen till att eventuella obehag i samband med att du får bedövning minskar eller helt försvinner. Även andra behandlingsmoment som kan upplevas obehagliga kan kännas lättare att acceptera.

Vanligen upphör effekten av lustgas helt cirka 30 minuter efter behandling. Det innebär till exempel att det inte finns några medicinska restriktioner för att köra bil eller annat fordon efter en 30 minuters vila.

Observera. Tänk på att inte äta eller dricka 4 timmar före behandling.

Lustgas ska undvikas de tre första månaderna av en graviditet.

Lindrig förkylning kan, inför behandlingen, avhjälpas med nässpray men vid kraftig förkylning kan det vara bättre att välja ett annat behandlingstillfälle.

Tandbehandling under lustgas ingår i den kostnadsfria barntandvården och är alltså gratis för barn och unga till och med 23 års ålder.

För vuxna, över 24 år, debiteras en särskild kostnad för lustgasbehandling. Detta ingår i tandvårdens högkostnadsskydd. Kostnaden för den tandvård som utförs tillkommer.

Behandling med lustgas är resurskrävande och innebär en del extra förberedelser för oss. Den planerade behandlingstiden är ofta lång. Därför måste du lämna återbud i god tid om inte tiden vi föreslår passar dig. Någon annan kan då få tillgång till tiden.

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med Folktandvården.

Midazolam -innehållet är samma som patientinformation

Lugnande medicin vid tandbehandling

Midazolam är ett läkemedel som används för att dämpa oro och rädsla inför olika tandbehandlingar. Medlet ges på kliniken som dryck 15-20 minuter före tandbehandling. Om barn har problem med att dricka medicinen kan medlet också ges i ändtarmen 10-15 min före behandling. Det är viktigt att din tandläkare känner till din egen/ditt barns aktuella medicinering för att kunna bedöma om det är lämpligt att ge lugnande medicin.

Du/ditt barn måste ha någon som följer med till tandkliniken. Följeslagaren ska vara med under hela behandlingen på kliniken.

Före behandling

Du/ditt barn ska vara fastande 4 timmar innan behandlingen. Det går bra att dricka ½ glas klar vätska fram till 2 timmar innan behandlingen. Grapefruktjuice ska undvikas tre dygn innan behandlingen.

Efter behandling

Förutom att dämpa ängslan och oro ger medicinen också muskelavslappning. Efter avslutad behandling stannar ni kvar till dess att benen bär ordentligt. Räkna med att det tar minst en timme.

Om du som vuxen ska behandlas

Meddela din tandläkare om du är gravid eller ammar. Du får inte cykla, framföra bil eller annat fordon förrän tidigast efter ett dygn.

Vila de första timmarna efter behandlingen, och planera endast för enkla sysslor resten av dagen.

Om det är ditt barn som ska behandlas

Barnet skall ha en vuxen intill sig vid hemfärd. De tre första timmarna efter behandling ska barnet inte lämnas ensamt och bör även hållas under uppsikt resten av dagen. Detta gäller speciellt om barnet är trött efter behandlingen. Låt inte ditt barn cykla eller leka vilda lekar. Barn är ofta nyfikna och kan ställa frågor om vad som händer hos tandläkaren. Beröm ditt barn och svara så positivt som möjligt. Undvik att ge negativa beskrivningar om själva behandlingen. Det är viktigt att barnets självförtroende stärks inför framtida tandläkarbesök.

Om ni har frågor ta gärna kontakt med Folktandvården.

Narkos Barn -innehållet ska vara samma som patientformation

Information till dig som har ett barn som ska sövas för tandbehandling
Ert barn har fått en tid för tandbehandling under narkos.

Förberedelser innan ni kommer

- Barnet ska vara friskt och fastande.

Fastande innebär att barnet inte får äta eller dricka någonting efter klockan 24.00 natten mot behandlingsdagen. Orsaken till fastan är att magsäcken ska vara tom vid sövning (narkos) då det annars finns risk att maginnehållet hamnar i lungorna.

Om dessa föreskrifter inte följs kan barnets behandling bli inställd.

Måste något läkemedel tas på morgonen så får det göras med så lite vatten som möjligt.

- Eventuella piercingar i näsa, läppar eller tunga måste vara borttagna.

- Nagellack på både finger- och tånaglar ska vara borttaget.

- Kontaktlinser måste tas ut innan sövning.

- Smycken och andra värdeföremål lämnas hemma, då operationsavdelningen inte tar ansvar för dem.

Vid behandlingen

På enheten där barnet ska sövas får ni träffa tandläkaren som ska utföra behandlingen. I samråd med vårdnadshavare, barn och narkospersonal ges lugnande medel. Barnet behöver din närvaro vid sövning och uppvakning varför det är olämpligt att syskon medföljer vid besöket. En vårdnadshavare får följa med barnet fram till sövning och på uppvakningsavdelningen.

Efter behandlingen

De två första timmarna efter behandling ska barnet inte lämnas ensamt. I samråd med personal på uppvakningsavdelningen beslutas det om när det är lämpligt för er att åka hem.

Barnet bör hållas under uppsikt under resten av dagen. Låt inte barnet cykla, sporta eller leka vilda lekar. Barn är ofta nyfikna och ställer frågor om vad som hände hos tandläkaren. Beröm ditt barn och svara så positivt som möjligt, undvik att ge negativa beskrivningar om själva behandlingen. Det är viktigt att barnets självförtroende stärks inför framtida tandläkarbesök.

Tillgången på narkostider är mycket begränsad. Det är därför viktigt att ni meddelar oss så snart som möjligt om barnet blir sjuk eller om ni får andra förhinder så att någon annan patient kan erbjudas tiden.

Narkos Vuxen -innehållet ska vara samma som patientformation

Information till dig som ska sövas för tandbehandling

Du har fått en tid för tandbehandling under narkos.

Förberedelser innan du kommer

- Du måste vara frisk och fastande inför behandlingen. Fastande innebär att du inte får äta eller dricka någonting efter klockan 24.00 natten mot behandlingsdagen. Orsaken till fastan är att magsäcken ska vara tom vid sövning (narkos) då det annars finns risk att maginnehållet hamnar i lungorna.

Om dessa föreskrifter inte följs kan din behandling bli inställd.

Måste något läkemedel tas på morgonen så får det göras med så lite vatten som möjligt.

- Eventuella piercingar i näsa, läppar eller tunga måste vara borttagna.
- Nagellack på både finger- och tånaglar ska vara borttaget.
- Kontaktlinser måste tas ut innan sövning.
- Smycken och andra värdeföremål lämnas hemma, då operationsavdelningen inte tar ansvar för dem.

Vid behandlingen

På enheten där du ska sövas får du träffa den tandläkare som ska utföra behandlingen. I samråd med narkospersonal ges lugnande medel om du har behov detta.

Efter behandlingen

Efter sövningen ligger du kvar på uppvaksavdelningen i ca 2 timmar. Narkospersonalen ger dig mer information om detta när du kommer till sjukhuset.

Du får inte cykla, framföra bil eller annat fordon under resten av dagen. Det är därför bra om du kan ha med dig en följeslagare eller har någon som kan hämta dig efter behandlingen. Vila de första timmarna efter behandlingen och planera endast för enkla sysslor resten av dagen.

Tillgången på narkostider är mycket begränsad. Det är därför viktigt att du meddelar oss så snart som möjligt om du blir sjuk eller får andra förhinder så att någon annan patient kan erbjudas tiden.

Impl op -innehållet ska vara samma som patientinformation

Inför implantatoperation

Tänder som saknas kan i de flesta fall ersättas med kronor, broar eller proteser som förankras i titanimplantat/fixturer i käkbenet.

Du ska få implantat inopererade i käken.

Operationen

Inför operationen ger vi dig lokalbedövning och smärtstillande. Önskar du lugnande medicinering måste du meddela oss detta i förväg.

Vid operationen prepareras implantatsäten i käkbenet där implantaten sedan skruvas fast. Sårkanterna sluts med stygn.

Inläkningstiden varierar från 8 veckor till 6 månader, beroende på käkbenets kvalitet samt vilket implantatsystem som används i just ditt fall.

Efter operationen

För att optimera munhygien i operationsområdet skall du skölja med något av följande preparat: Paroex, Corsodyl eller Flux Pro 2 gånger dagligen tills stygnen tas bort, cirka 10 dagar efter operationen.

Normalt räcker det med paracetamol (t.ex. Alvedon; Panodil, Reliv) eventuellt i kombination med t.ex. ibuprofen som smärtstillande de första dagarna efter operationen.

Det är helt normalt att det blöder lite från operationsområdet någon dag efter ingreppet. För att minska blödningen bör du inför sänggående ha något högre huvudläge än vanligt.

Du kan äta vanlig mat när bedövningen släppt 3-4 timmar efter operationen, förutsatt att du inte får mat i operationsområdet. Vid implantatoperation i en hel käke får du äta all mat som du inte behöver tugga.

Det är normalt med svullnad i kinden en vecka efter operationen och blåmärke kan uppstå.

Du behöver i regel inte stanna hemma efter operationen med undantag om vi opererat in implantat i en hel käke.

Om du har en avtagbar protes, får denna inte användas förrän stygnen har tagits bort och protesen slipats ur på insidan så den inte trycker på implantatet.

Forts. Impl op

Efterföljande behandling vid tvåstegskirurgi

(Gäller ej alla)

Efter inläkningstiden (8 veckor - 6 månader) blir du kallad till ytterligare en operation; distansoperation. Vid denna operation görs en öppning i tandköt-tet och läkhättan som sitter på implantatet byts ut till en cylinderformad skruv; läkdistan.

Läkdistan formar tandköt-tet inför den kommande kron-, bro- eller protes-behandlingen som påbörjas ungefär en vecka därpå.

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med Folktandvården.

Rökstopp

Tandvården i Norrbotten har infört en rekommendation om rökstopp 4 veck-or före samt 8 veckor efter planerad operation.

Skälet är att det finns vetenskapligt belägg för att rökfrihet minskar riskerna för komplikationer efter operationen.

Man får generellt en bättre sårhäkning och det är även visat att rökning utgör en ökad risk för att implantatet skall gå förlorat.

Rökstopp minskar således komplikationsrisken och är en säkerhetsåtgärd för dig som är patient.

Hjälp och stöd

Om du behöver hjälp och stöd att sluta röka kan vi erbjuda remiss för rökav-vänjning till någon av våra hälsocentraler.

T-kir -innehållet ska vara samma som patientinformation

Inför tandkirurgi

Du har fått en tid hos oss för tandkirurgisk behandling.

Denna information gäller generellt för operationer i munhålan.

Före operationen

Operationen sker med lokalbedövning. Du kan med fördel själv medicinera med paracetamol (Alvedon/ Panodil/ Reliv) efter vikt innan operationen, då detta minskar smärta efter operationen.

Till dig som röker: Rökning i samband med en operation ökar risken för komplikationer, till exempel försämrad sårhäkning eller infektion. Vi rekommenderar därför starkt att du avstår från rökning, åtminstone under veckan före och veckan efter operationen.

Receptfri nikotinersättning, till exempel nikotintuggummi finns att köpa på apotek.

Under operationen

Sterila dukar läggs över bröst och hår för att minska risken för infektion. Slemhinnan över det område som ska opereras lossas och viks åt sidan. Ofta får man borra bort lite käkben och om en tand ska tas ut kan man behöva dela den innan den kan tas ut. Såret sys ihop med stygn som lossnar efter ungefär en vecka. I vissa fall avlägsnas stygnen på tandkliniken efter ca 10 dagar.

Direkt efter operationen

Efter operationen skall såret läka. Genom att hålla en god munhygien och undvika tobak (rökning och snusning) ger du de bästa förutsättningarna för detta. Du bör skölja munnen med klorhexidinlösning (Paroex eller Hexident, receptfritt på Apotek) morgon och kväll i tio dagar för att minska risken för infektion.

Du bör undvika mat som är hård eller svår att tugga de första dagarna. Du kan borsta tänderna som vanligt, utom i det nyopererade området.

Smärta?

Kan upplevas då bedövningen släpper efter operationen. Den kan fortsätta några dagar och avtar sedan successivt. Du kan minska smärtan genom att börja ta värktabletter redan någon timme efter operation.

Rekommendation om vilka läkemedel som passar just dig, får du av din tandläkare.

Forts. T-kir

Svullnad?

Kan uppkomma, men det behöver inte ge anledning till oro. Om svullnaden ökar, eller kommer först efter 3-4 dagar bör du kontakta din tandläkare.

Svårighet att gapa?

Kan du uppleva upp till en vecka efter operationen.

Blödning?

I operationsområdet kan du stilla blödningen genom att bita på en kompress eller en hoprullad ren näsduk så den trycker på området i 30 minuter. Om blödningen inte upphör, upprepar du proceduren några gånger. Kontakta din tandläkare om det inte hjälper.

Vid blödning bör du inte skölja munnen. Håll blödningsstället högt. Sitt upp eller ha huvudet högt natten efter operationen.

Dagarna efter operationen

Feber?

Dagen efter operation kan du få en höjning av din kroppstemperatur till 38 grader, vilket är helt normalt. Om temperaturhöjningen kvarstår eller ökar, kontakta din tandläkare.

Dålig smak och lukt?

Från såret efter några dagar kan tyda på en infektion, eller på att matrester kommit in i såret. Ta kontakt med din tandläkare, då såret kan behöva behandlas.

Blåmärke?

Kan uppkomma och är normalt efter en operation.

Känselförändring?

I läpp, kind eller tunga kan uppkomma vid injektion av lokalbedövningsmedel, samt vid operationen. Detta gäller speciellt vid avlägsnande av visdomständer i underkäken, som ibland ligger i nära relation till nerven. I undantagsfall kan denna känselförändring bli permanent. Din tandläkare kan informera om denna risk vid just ditt ingrepp.

Ta kontakt med din tandläkare om du har känselförändring dagen efter operationen.

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med Folktandvården.

Waran -innehållet ska vara samma som patientinformation**Waran**

Inför din kommande behandling hos oss i Folktandvården behöver ditt pK-INR värde justeras till _____.

Ta kontakt med din ansvariga waransköterska och meddela vilken dag du fått tid för behandling och vilket pK-INR vi önskar att du har.

Ditt pK-INR ska vara taget senast dagen före ingreppet, då detta värde snabbt kan ändras.

Således får du en tid för behandling tisdag, onsdag eller torsdag. Fredagar undviker vi att behandla dig med waran, om blödningskomplikation uppstår.

Efter ingreppet kommer vi att applicera och förskriva läkemedel som hämmar waranets effekt lokalt och skicka med dig kompresser.

Om det blöder efter ingreppet är det viktigt att du:

- Har högt huvudläge.
- Undviker att spotta och skölja munnen.
- Applicerar kompresser som du biter på lätt i minst 30-60 minuter.
- I möjligaste mån avvaktar med födo- och dryckintag tills det i stort sett slutat blöda. Små blödningar får man dock räkna med i några dagar och särskilt vid födointag då koaglet lättare lossnar och ny blödning kan uppkomma.

Vid behov av smärtlindring, bör du i första hand medicinera med paracetamol.

Kontakt vid frågor:

Vid frågor kontaktar du i första hand din ansvariga tandläkare/tandhygienist. Kvällstid och på helger kommer du i kontakt med jourhavande via 1177.