



Gäller för Region Norrbotten

Ansvarig för dokument – Region Norrbottens läkemedelskommitté

## Varning och försiktighet

Observera ökad risk för hypokalcemi hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Riskerna för att utveckla hypokalcemi med åtföljande förhöjda halter av paratyroideahormon ökar med ökande grad av nedsatt njurfunktion. För dessa patienter är det särskilt viktigt med adekvat intag av kalcium och vitamin D samt regelbunden kontroll av kalcium.

Informera patient att det är viktigt med god munhygien. Rutinmässig tandundersökning är inte nödvändig. Osteonekros i käken (benvävnadsdöd) har rapporterats som ovanlig biverkan. Risken är högre vid samtidig cancer, behandling med cellgifter eller kortison eller dålig munhygien. Vid dessa faktorer bör tandundersökning övervägas. Vid planerat ingrepp i tand eller käke ska ingreppet göras före insättning.

De vanligaste biverkningarna med denosumab är muskuloskeletal smärta och smärta i armar och/eller ben.

## Innan behandling

Vid behandlingstillfället ska patienten vara väl hydrerad. Ingen fasta behövs utan hen kan äta som vanligt.

## Recept

Denosumab förskrivs på recept. Använd gärna avsedd läkemedelsmall vid ordination.

## Administrering

Första doseringstillfället bör tas på hälsocentral/klinik men vid kommande tillfällen kan patienten, om det bedöms lämpligt, själv eller med hjälp av anhörig, ta läkemedlet.

Om hälso- och sjukvårdspersonal administrerar läkemedlet ska administreringen dokumenteras i Cosmics läkemedelsmodul i utdelningsvyn. För att möjliggöra signering i utdelningsvyn behöver läkare ange att läkemedlet får receptadministreras, se [framtaget arbetssätt](#).

Inspiration till detta dokument är hämtat från Region Kronoberg.