Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning

Läkemedelskommitténs rekommendation

Tack till Läkemedelskommittén i Kalmar för idéer och del av bakgrundsmaterial till denna lista.

Symtom

Patient med hastigt påkommet tillstånd med risk för intorkning, till exempel:

- Diarréer och/eller kräkningar
- Feber (temperatur > 38˚C)
- Intorkning
- Annan akut sjukdom som medför svårigheter att äta eller dricka

Värmebölja kan ytterligare öka risken för intorkning.
Vissa andra akuta sjukdomar kan ytterligare öka risken för akut njursvikt.

Läkemedel där tillfälligt uppehåll rekommenderas vid risk för intorkning

Läkemedelsgrupp	Exempel på substans	Följ upp
ACE-hämmare och kombinationer	enalapril, ramipril, enalapril + diuretika	Blodtryck, elektrolyter, eGFR
Angiotensinreceptorblockerare (ARB) och kombinationer	losartan, kandesartan, kandesartan + diuretika, valsartan + sakubitril (Entresto)	Blodtryck, elektrolyter, eGFR
Diuretika, även kaliumsparande, inkl kombinationer	Bendroflumetiazid, hydroklortiazid, klortalidon, metolazon, amilorid, spironolakton, eplerenon, furo-semid, torasemid, bumetanid	Blodtryck, elektrolyter, eGFR
Digitalis	digoxin	Puls, eGFR, s-digoxin
Metformin inkl kombinationer SGLT2-hämmare, inkl kombinationer Sulfonylurea-preparat	metformin inkl komb med t ex sitapliptin, empagliflozin och dapagliflozin dapagliflozin, empagliflozin Glibenklamid, glimepirid	Blodsocker och urinketoner, elektrolyter, eGFR Övervakning av volymstatus, elektrolyter och urinketoner
NSAID = COX-hämmare (även receptfria preparat)	naproxen, ibuprofen, diklofenak, celecoxib, etoricoxib	Smärtbedömning, eGFR

Kontakta läkare för de övriga preparaten på läkemedelslistan.

Tänk på att vissa läkemedel kan behöva övervakas extra noga med kontroll av serumkoncentration vid risk för intorkning, t ex ciklosporin, takrolimus och litium.

Beakta även risken för elektrolytrubbningar i samband med laxantiabehandling.