



INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN

SMITTSKYDD, REGION NORRBOTTEN, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16

Nr 3 – 2018

Innehåll

<i>Gratis pneumokockvaccination till patienter i risk i Norrbotten</i>	1
<i>Riskgrupper som rekommenderas (gratis) pneumokockvaccination/Hur och med vilka vacciner... ..</i>	2
<i>Vem vaccinerar/Aktuella pneumokockvaccin/Kostnad</i>	3
<i>Beställning av vaccin/Inför pneumokockvaccination/SveVac</i>	4

Här kommer ett extranummer av Smittsant – information från Smittskyddsläkaren med ett bra budskap:

Gratis pneumokockvaccination till riskpatienter i Norrbotten

Vid regionfullmäktiges möte den 14 februari 2018 beslutades att avgiftsfri pneumokockvaccinering till vissa riskgrupper skall införas i Norrbotten. Ett beslut som intensivt applåderas av smittskyddet. Vi vet att Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Bakterien kan även orsaka andra sjukdomstillstånd i övre luftvägarna men också ge allvarigare infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Vi vet att dessa infektioner orsakar stort lidande för de drabbade patienterna och när vi tittat på statistiken så ser vi att pneumokockinfektioner också medför en påtaglig belastning för vården. I medeltal bedöms omkring 500 patienter per år behöva slutenvårdsinsats. Medelvårdtiden för dessa patienter är drygt åtta dagar. Med andra ord ”kostar” Pneumokockerna sannolikt över 4 000 vårddyggn på sjukhusen i länet årligen. Pneumonidiagnos i öppenvården är ju också en vanlig diagnos och vi vet att drygt 50 % av dessa är pneumokockorsakade. Tänk om vi med vaccination kunde reducera den belastningen på vården? Om vi fick våra patienter att vaccinera sig skulle vi se både hälsomässiga och hälsoekonomiska vinster.


Riskgrupper som rekommenderas (gratis) pneumokockvaccination

1. **Personer 65 år och äldre**
2. **Vuxna < 65 år med vissa sjukdomar/måttligt nedsatt immunförsvar** exempelvis kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, avancerad leversjukdom - fibros/cirrhos, kronisk njursvikt, diabetes, neuromuskulär sjukdom, alkoholism samt personer med BMI över 40.
3. **Vuxna patienter med kraftigt ökad risk** för att drabbas av pneumokockinfektion som personer med gravt nedsatt immunförsvar på grund av primär immunbrist samt vid sekundära immundefekter till följd av sjukdom eller immunsupprimerande behandling. Även patienter med nedsatt mjältnfunktion - anatomisk eller funktionell aspleni, nefrotiskt syndrom, cochleaimplantat, likvorläckage, cystisk fibros samt hematologisk stamcells-transplanterade hör till den gruppen.

Hur och med vilka vacciner?

För detaljer – [se Pneumokockvaccination vuxna](#)

Vi har också gjort en ”lathund” som ni hittar på vår Vaccinsida - [Pneumokockvaccination av vuxna i Region Norrbotten!](#) Så här ser den ut:



Vem vaccinerar?

Indikation bör bedömas samt vaccin administreras i samband med andra planerade läkarbesök/återbesök på hälsocentral och specialistmottagningar eller i samband med influensavaccination. Alla vårdgivare – även slutenvårds-mottagningar måste hjälpa till för att vi ska lyckas med kampanjen!

Aktuella pneumokockvaccin

Det finns 2 typer av pneumokockvaccin och vilket vaccin som ska ges beror på vilken riskgrupp patienten tillhör och om patienten tidigare har vaccinerats mot pneumokocker. Observera att vissa riskgrupper ska erhålla boosterdosor!

Pneumovax® (polysackaridvaccin) – kort information:

- Administreras i.m. (deltoideusmuskeln på överarmen) eller s.c.
- Kan administreras samtidigt som influensavaccination men på olika injektionsställen
- Vaccination bör undvikas vid pågående infektion med feber och vid andra aktiva infektioner
- Vid planerad cancerbehandling eller annan immunosupprimerande behandling rekommenderas vaccination innan uppstart. Vid redan påbörjad eller ism. avslutad behandling rekommenderas konsultation av aktuell behandlande läkare
- Vanlig biverkan: Reaktion på injektionsstället förekommer inom 3 dagar efter vaccination

[Ytterligare information – se FASS](#)

Prevenar 13® (konjugatvaccin) – kort information

- Administreras i.m. (deltoideusmuskeln på överarmen) eller s.c.
- Vaccination ska skjutas upp vid akut sjukdom med hög feber. Lindrig infektion, som t ex en förkylning, utgör inte någon kontraindikation
- Kan administreras samtidigt som influensavaccination men på olika injektionsställen
- Vanlig biverkan är smärta/ömhet på injektionsstället samt tillfällig nedsättning av armens rörlighet. Även biverkan som huvudvärk, kräkning, diarré, feber och nedsatt aptit förekommer (framförallt hos yngre individer)

[Ytterligare information – se FASS](#)

Kostnad

Från 1 mars 2018 är pneumokockvaccination kostnadsfri för personer som tillhör någon riskgrupp.

Övriga vuxna får betala fullt pris enligt [Region Norrbottens prislista](#)

Beställning av vaccin

Pneumovax®

Beställs via [MSD Vaccinservice](#)

Prevenar 13®

Beställs från [Oriola](#)

Inför pneumokockvaccination

- Vi rekommenderar att patienten fyller i [Vaccinationsunderlag inför pneumokockvaccination](#)
- Vaccinationen ordineras av läkare
- Som vid andra vaccinationer ska lämplig medicinsk behandling och övervakning finnas tillgänglig i händelse av anafylaktisk reaktion

Registrera vaccinationen i SveVac

[SveVac](#)

För instruktion SveVac – se [eLearning instruktion](#) (influenta):

Samtycke i SveVac. Då vi avser följa upp vaccinations-frekvensen i Norrbotten ska patientens samtycke för detta sökas och om patienten tackar ja ska detta läggas till i SveVac. Detta inte påverkar de samtycken som registrerats på personer redan tidigare inlagda i Svevac.

Frågor om behörighet till SVEVAC besvaras av
Närsjukvården, Leena Granström.
(länk e-post: leena.granstrom@norrbotten.se)

All information kring pneumokockvaccination [hittar ni här!](#)

anders.nystedt@norrboten.se
0920-28 22 45

jonas.hansson@norrboten.se
0920-28 36 19

ann-louise.svedberg-lindqvist@norrboten.se
0920-28 36 09

ann-marie.cylven@norrboten.se
0920-28 32 93

inga-lill.josefsson@norrboten.se
0920-28 36 16