

Handläggning av patient med VRE

Smittskyddsåtgärder

- VRE klassificeras som anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen (SmL).
- Patienten informeras om sitt bärarskap och smittskyddsbladet går igenom;
Smittskyddsblad från Smittskyddsläkarföreningen samt sjukdomsinformation (läkar- och patientinformation).
- Smittskyddsanmälan skickas in.
- Smittamärk journal. Patientens journal märks VRE-bärarskap under "Smittaknappen" (PA13 i VAS). Hänvisning till datum och en aktuell journalanteckning ges.

Medicinsk handläggning

- Patientansvarig läkare på den aktuella provtagande kliniken får rollen som behandlande läkare och ansvarar för att åtgärder vidtas och att smittspårning utförs.
- Bärarskap eller infektion med VRE får aldrig fördröja eller förhindra en patient från att erhålla den vård eller det omhändertagande hans eller hennes tillstånd kräver.
- Den behandlande läkaren ansvarar för handläggning och behandling av eventuell infektion med VRE. Jourhavande på Infektionskliniken bör konsulteras angående antibiotikaval.
- Vid fall inom slutenvård eller omsorg ska patientansvarig läkare så snart som möjligt upprätta **kontakt med Vårdhygien** och ansvarar, i samråd med Vårdhygien, för åtgärder som minimerar risk för smittspridning på vårdavdelningen eller boende.
- Vid fall i öppenvård kan, utöver smittskyddsanmälan, även direkt kontakt med smittskyddet övervägas.

Smittspårning

- Var kan patienten ha blivit smittad utreds, utlandsmitta eller inhemsk.
- Smittspårning är framför allt aktuellt vid fall inom vård och omsorg för att utröna eventuell smittspridning, görs med stöd från Vårdhygien. Omfattande provtagning kan bli aktuell.
- Smittspårning i samhället övervägs men i regel är provtagning inte aktuell, Smittskydd kan vara rådgivande.

Uppföljning

- Om patienten skrivs ut till hemmet kan primärvården vid behov kontaktas för samordning.
- Om patienten skrivs ut till annan vårdinrättning ska medicinskt ansvarig där informeras.
- Om patienten har en pågående infektion med VRE ansvarar den behandlande läkaren för att behandling och uppföljning inklusive eventuell kontrollodling sker. Vid behov med stöd av infektionskonsult.
- Patienten rekommenderas att påtala sitt bärarskap i samband med framtida vårdkontakter.
- När infektionen är färdigbehandlad skriver behandlande läkare remiss till infektionskliniken för bedömning av VRE-bärarskap.
- Uppföljningen av VRE-bärarskap på infektionskliniken innebär att eventuellt behov av samhällssmittspårning bedöms men sådan är sällan aktuell. I regel inte några åtgärder såsom läkarbesök. Uppföljande bärarskapsodlingar hos patient med känt VRE-bärarskap inte aktuella.

Journalmärkning och avmärkning

Patientens journal bör tills vidare vara fortsatt märkt för bärarskap av VRE, det finns ingen etablerad rutin för att avskryva bärarskapet.