

SMITTSANT

INFORMATION FRÅN SMITTSKYDDSLÄKAREN


Nr 3/99

990930

Influentatider

Det finns en sak inom smittskyddet som man kan vara säker på och det är att influensaepidemin troget kommer tillbaka varje år. Oftast kommer epidemin till Sverige mellan vecka 43 och vecka 4 så det är hög tid att påbörja vaccinationsinsatserna.

Att influensan har effekter på folkhälsan framgår av följande sammanställning av det ökade dödstalet i Sverige under influensaepidemin de senaste åren;



Fjölårsäsongens influensa A (H3 Sydney-lik som också dominerade säsongen 97/98) fick ett ordentligt fäste i landet och det har aldrig tidigare diagnosticerats så många fall av influensa i Sverige som under 98/99. Att dödstalsökningen trots detta begränsades till 3.300 är sannolikt, åtminstone till en del, en effekt av de vaccinationskampanjer som genomförts.

Att vaccinationsinsatser också har hälsoekonomiskt gynnsamma effekter har visats i den influensa- och pneumokockstudie som genomfördes i Stockholm i fjol. Man gick ut och erbjöd (brev, annonser, affischer) alla stockholmare över 64 år subventionerad vaccination. Därefter studerade man vårdkonsumtion hos vaccinerade i jämförelse med icke vaccinerade. 38 procent av alla stockholmare över 64 vaccinerades (120.000 mot influensa + 90.000 mot pneumokocker) och man har konstaterat en höggradigt signifikant reduktion av behov av sjukhusvård i den vaccinerade gruppen. Man räknar med att man "sparat" 1000-1100 vårdtillfällen och 25-35 miljoner kronor på en insats som kostade 3,7 miljoner.

Det är således viktigt ur fler aspekter att vi med våra vaccinationskampanjer försöker nå så många som möjligt av våra patienter som omfattas av socialstyrelsens rekommendation.

Årets influensa på södra halvklotet domineras även i år av H3N2 Sydney-lik virus och vaccinet i år kommer att vara identiskt med fjolårets. **AN**

Viktigt vaccinera riskgrupperna

Socialstyrelsen rekommenderar i SOSFS 1997:21 årlig influensavaccination till:

- Personer med kronisk hjärt- och eller lungsjukdom, i synnerhet med hjärtsvikt och nedsatt lungfunktion.
- Personer över 65 års ålder. Indikationen ökar med stigande ålder och vid underliggande kronisk sjukdom.
- Personer med nedsatt immunitet av sjukdom eller läkemedel.
- Personer med metabola sjukdomar ex diabetes typ 1.

Socialstyrelsen ger i SOSFS 1994:26 rekommendationer om vaccination mot pneumokocker. Indikationerna för vaccination sammanfaller i stort med de för influensa. En förnyelsedos blir i de flesta fall aktuell efter 5-10 år. Framtida studier får visa om ytterligare förnyelsedoser behövs. **UJ**

Ny föreskrift från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har kommit med nya föreskrifter om vaccinationsverksamheten som innebär att en sjuksköterska får göra det medicinska ställningstagandet vid vaccination. Se bilaga SOSFS 1999:18.

UJ



Kostnader för vaccination

Vaccination mot influensa kostar 160 kronor

Vaccination mot pneumokocker kostar 220 kronor

Vaccination mot både influensa och pneumokocker kostar 280 kronor.

De som omfattas av socialstyrelsens rekommendation om vaccination får inräkna kostnaden för vaccination och besöksavgiften i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

UJ

Vi som jobbar på smittskyddet är:

- **Anders Nystedt**, smittskyddsläkare. 0920-78335, 070-5878335, anders.nystedt@nll.se
- **Ulla Johansson**, utredare. 0920-78333, 070-5878333
 - **Alice Larsson**, assistent 0920-78330
 - **Evabritt Pettersson**, kanslist 0920-71211

Bilaga

Socialstyrelsens föreskrifter om vaccinationsverksamhet - SOSFS 1999:18 (M)

beslutade den 10 september 1999.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § första stycket 1 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m m.

1 § En sjuksköterska får göra det medicinska ställningstagandet vid vaccination endast under förutsättning

- att ordinationen görs i enlighet med generella vaccinationsprogram,
- att sjuksköterskan har genomgått vidareutbildning till distriktssköterska eller vidareutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller motsvarande, och
- att sjuksköterskan i övrigt bedöms lämplig av den för verksamheten ansvariga läkaren.

2 § Med generella vaccinationsprogram avses vaccinationsprogram i följande allmänna råd:

- Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1990:21) om profylax mot difteri och stelkramp
- Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1994:26) Vaccination mot pneumokocker
- Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:1) Vaccination av barn
- Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:21) Vaccination mot influensa.

3 § Vaccination mot gula febern får utföras endast vid medicinska institutioner och mottagning som godkänts av Socialstyrelsen

-
1. Denna författning träder i kraft omedelbart
 2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1990:20) om vaccinationsverksamhet.
-

Socialstyrelsen
Nina Rehnqvist

Eva Lithander

