

# Vaccination mot pneumokocker - generellt direktiv om läkemedelsbehandling

Avser vaccin: Pneumovax

## Berörda enheter

### Syfte

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling avseende vaccination mot pneumokocker enligt HSLF-FS 2017:37

Pneumokockvaccination enligt generellt direktiv om läkemedelsbehandling omfattar sjuksköterskor vid berörda enheter enligt ovan.

### Indikationer för pneumokockvaccination

Sjuksköterskor som omfattas av de generella direktiven kan administrera pneumokockvaccin till vuxna personer som tillhör nedan beskrivna *riskgrupper* förutsatt att personen saknar kontraindikation för pneumokockvaccination.

- personer 65 år och äldre
- vuxna personer med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom/neysatt lungfunktion
  - avancerad leversjukdom fibros/cirrhos
  - kronisk njursvikt
  - diabetes
  - neuromuskulär sjukdom
  - beroendesjukdom som alkoholism eller intravenöst missbruk
  - personer med BMI över 40
  - rökare, svetsare

Vid pneumokockvaccination till personer med *kraftigt ökad risk* enligt PM ”Pneumokockvaccination av vuxna i Region Norrbotten” krävs läkarordination.

### Kontraindikation

Innan ställningstagande till administrering av pneumokockvaccin till ska personen fylla i ”Underlag för vaccination mot pneumokocker”.

Om personen anger överkänslighet eller allergi kontaktas behörig förskrivare (läkare) för bedömning och ev. ordination.

Läkare kontaktas om personen tidigare haft någon allvarlig reaktion ( yrsel, svimning, andnöd eller utslag) i samband med vaccination.

Även personer som har någon behandling som kan påverka immunförsvaret, t ex cytostatikabehandling bedöms av läkare.

Gravida kvinnor bör endast vaccineras då vaccination är absolut nödvändig.

Vid pågående infektion/feber bör vaccinationen senareläggas.

Läkemedel för behandling av anafylaxi eller annan överkänslighetsreaktion ska alltid finnas tillgänglig vid vaccination.

## Dosering vuxna

Upphandlat polysackaridvaccin mot pneumokockinfektion:

**Pneumovax** (inj.vätska)

Vaccinet levereras i förfylld spruta.

Vaccinet ges som engångsdos. Revaccination rekommenderas inte.

Dos: 0,5 ml intramuskulärt i överarmens deltoideusmuskel.

Vid behandling med blodförtunnande läkemedel som Waran eller likande ges vaccinet istället djupt subkutant.

## Dokumentation

Pneumokockvaccination dokumenteras enligt vårdgivarens rutin.

---

Datum: \_\_\_\_\_

Medicinsk ansvarig läkare: \_\_\_\_\_

Namnförtydligande: \_\_\_\_\_

*Det generella direktivet ska uppdateras och signeras årligen.*