

# PM STELKRAMPSPROFYLAX FÖR VUXNA

## GRUNDVACCINATION MOT STELKRAMP (tetanus)

**Dos 1:** Monovalent vaccin (Tetanus vaccin) alt. dT-vaccin (diTeBooster)

**Dos 2:** 1-2 mån efter dos 1 (monovalent alt. dT-vaccin)

**Dos 3:** 6-12 mån efter dos 1 (monovalent alt. dT-vaccin)

**Dos 4:** 10 år efter dos 3 (dT- eller dTp-vaccin)

**Påfyllnadsdoser:** Vart 20:e år, med start efter den 4:e dosen, (dT- eller dTp-vaccin)

Monovalent vaccin mot tetanus (Tetanus vaccin) finns att beställa via licens. Vid brist på monovalent fulldosvaccin rekommenderas vaccin med reducerad antigenhalt (dT eller dTp-vaccin) till grund- och påfyllnadsdoser enligt schema ovan. För närvarande är diTeBooster (dT-vaccin) upphandlat.

Personer, som är födda från mitten av 50-talet, har som barn erbjudits grundvaccination, plus en boosterdos vid 10 års ålder. Flertalet äldre män har fått vaccinationer i samband med militärtjänstgöring. Vaccinationsskyddet hos kvinnor födda före 50-talet är dock sämre.

## ÅTGÄRDER TILL SKYDD MOT STELKRAMP VID INTRÄFFAD SKADA

### Tidigare ovaccinerad

#### **Vid skadetillfället:**

Ge humant immunglobulin mot stelkramp (Tetagam) 250 IE im om det bedöms finnas risk för stelkramp. Påbörja samtidigt grundvaccination enligt schema (se ovan). Immunglobulin och vaccin ges på olika kroppsdelar.

### Tidigare fått 1 dos stelkrampsvaccin

#### **Vid skadetillfället:**

Grundvaccination dos 2  
Därefter fortsatt vaccination enligt schema (dos 3 etc.)  
Ev. immunglobulin (Tetagam) ges endast om 1 dygn eller mer förflutit från skadetillfället, om skadan är kraftigt förorenad eller att misstänkt förorening inte går att excidera.

### Tidigare fått 2 doser stelkrampsvaccin

#### **Vid skadetillfället:**

Om > 6 månader har förflutit sedan dos 2 ges dos 3 enligt grundschema  
Om < 6 månader har förflutit sedan dos 2 ges normalt inget vaccin (dos 3) förrän det gått minst 6 månader.

### **Tidigare fått 3 doser stelkrampsvaccin**

#### **Vid skadetillfället:**

Om > 10 år har förflutit sedan dos 3 ges dos 4 enligt schema.

Om < 10 år har förflutit ges normalt inget vaccin.

### **Tidigare fått 4 eller fler doser stelkrampsvaccin**

#### **Vid skadetillfället:**

Om det gått > 20 år ges en påfyllnadsdos (dT- eller dTp-vaccin)

### **Okänt vaccinationsstatus**

Vid misstanke om att personen är ovaccinerad, och där läkare bedömer att det finns risk för stelkramp:

Ge immunglobulin mot stelkramp (Tetagam) 250 IE im

Provta patienten för bestämning av antikropps nivå för tetanus (se [labhandboken](#))

Efter provtagning ges en dos vaccin.

Fortsatt vaccinering bestäms utifrån provsvar.

Samtliga **Akutmottagningar och Infektionsmottagningen Sunderby Sjukhus** ska kunna tillhandahålla **Tetagam (immunglobulin mot tetanus)** när behov uppstår.

### **Ytterligare information**

[Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp \(Folkhälsomyndigheten\)](#)