

Förberedelser inför Datortomografi, Magnetundersökningar och Ultraljud

	Rosa Nexiva Diffusics 25 mm eller Powerport/Powerpicc/Midline märkt med 5ml/s
	KREA (Metformin behöver inte sättas ut om GFR är högre än 45)
	Längd & Vikt
	Dricka 1,5 Liter vatten
	Dricka Kontrast
	Fasta 4 timmar
	Valfri pvk
	DT/MR-formulär ifyllt och återkopplat med RTG- personal vid avvikelse
	Premedicinering vid behov (smärtstillande/lugnande)

DATORTOMOGRAFI	Avlägsna alla lösa metallidelar
1. "Rädda Hjärnan" MULTITRAUMA AORTA akut	Om möjligt:    
2. HALSKÄRL/HJÄRNA ANGIO	    Helst i höger arm/hand + Uppvätskning
3. AORTA ej akut	    + Uppvätskning
4. HALS/THORAX/BUK/SKELETT utan kontrast	-
5. HALS/THORAX/BUK med kontrast	    
6. HJÄRNA infarkt/blödning	-
7. HJÄRNA med kontrast	    + Uppvätskning
8. THORAX med kontrast	    + Uppvätskning
MAGNETKAMERA	Metallfria patientkläder. Avlägsna alla lösa metallidelar
1. MR - Standard	  
2. MR – med kontrast	    
3. MR – Buk utan kontrast	    
4. MR – Buk med kontrast	     
5. MR - Tunntarm	      

ULTRALJUD	
1. Lever/Galla/Pancreas	 Fasta 4 timmar
2. Urinblåsa	Fylld urinblåsa (kissnödig)
3. Övriga ultraljud	Inga förberedelser
4. Alla bukbiopsier	   Fasta 6 timmar , Hb, TPK, PK, APTT, blödningstid, leverstatus. Ev. etiketter. OBS! Remittenten ansvarar för att patienten observeras 4 timmar efter ingreppet.
5. Övriga biopsier och dränage	   Fasta 6 timmar , TPK, PK. Ev. etiketter