

Rutin ang. Paracetamol

ATC: N02BE01

Berörda enheter

Ambulansen Boden och Luleå

Preparatnamn:	Paracetamol
Beredningsform:	Tablett, suppositorier, infusion
Styrka:	Tablett: 500 mg Supp: 60 mg, 125 mg, 250 mg Infusion: 10 mg/ml
Terapeutisk effekt:	Analgetikum med snabbt insättande effekt
Indikationer:	<ul style="list-style-type: none">• Misstänkt sepsis• Tillägg till annan smärtbehandling hos vuxen och barn• Hög feber hos barn eller vuxen
Administrationssätt:	<ul style="list-style-type: none">• Peroralt (po)• Rektalt (pr)• Infusion (inf) <p><i>Intravenös tillförsel är kliniskt motiverad för att snabbt behandla smärta eller hypertermi, och/eller när andra administreringsvägar inte är möjliga</i></p> <p><i>Så länge tillståndet hos patienten tillåter (inga sväljsvårigheter eller kräkningar vid födointag) skall PERORAL administration alltid vara förstahands alternativ</i></p> <p><i>Observera att IV administration är potentare än Po/rektal tillförsel.</i></p>

Dosering:

Vuxen:

- 2 tab (1 g) po
- 100 ml (1 g) iv (hel flaska) under 15 min (ca 130 dr/min)

Barn:

- Dosering till barn (inklusive spädbarn) är 10-15 mg/kg kroppsvikt var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (se doseringstabellen).

Paracetamol, tabl/supp	Kg ca år	5 <1 år	10 1 år	15 3 år	20 5 år	25 7 år	30 10 år	40 12 år	50 14 år
10-15 mg/kg	Mg	60	125	250	250	375	250-500	250-500	500-1000

Kontraindikationer:

- Nedsatt leverfunktion
- Alltid efterfråga om intag av Paracetamol skett före kontakt med ambulans så att högsta dygnsdos inte överskrids (4 g hos leverfrisk vuxen och 60 mg/kg hos barn).
- Överkänslighet mot den aktiva substansen.

Försiktighet:

Bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel som innehåller Paracetamol.

Försiktighet bör iaktas hos astmapatienter som är känsliga mot acetylsalicylsyra, då milda reaktioner av bronkospasm har rapporterats med paracetamol (korsreaktion)

Biverkningar:

Allergisk reaktion, exantem (finrickigt utslag på bål och extremiteter som ibland kan ses vid t.ex. tredagarsfeber), urtikaria (sällsynt)

Interaktioner:

Inga av relevans prehospitalt

Överdoser:

- Buksmärtor
- Illamående
- Kräkningar

Behandling vid överdosering:

- Ventrikeltömning, Medicinskt kol
- På sjukhus behandling med acetylcysteininfusion

OBS!

Toxisk dos till vuxna i regel 140 mg/kg. Toxisk dos till barn ca 175 mg/kg.

Övrigt:

Patienter som går på behandling mot malign sjukdom kan ha sköra rektalslemhinnor. Var därför försiktig om suppositorier skall ges.