Myelografi med datortomografi

Patientinformation till dig som ska eller har genomgått DT myelografi

Vad är DT myelografi?

DT myelografi innebär att man får kontrastvätska injicerad i ryggmärgsvätskan innan DT-undersökningen. Proceduren går till på samma sätt som vid en spinal bedövning inför t.ex. en höftoperation, men med kontrastvätska istället för bedövningsmedel.

DT myelografi utförs i de fall MR bedöms olämpligt, men enbart DT inte ger tillräckligt bra visualisering av de strukturer som man är intresserad av.

Inför undersökning

Det är viktigt att du fyller i hälsodeklarationen noggrant inför undersökningen. Om du är allergisk mot något läkemedel eller äter blodförtunnande läkemedel är det viktigt att du fyller i det i hälsodeklarationen. Vissa blodförtunnande läkemedel kan behöva pausas ett par dagar innan undersökning. I så fall kommer du att få information om det.

Efter undersökningen

Efter undersökningen kommer du att kvarstanna på sjukhuset i 4h för observation. De närmaste 24h efter undersökning bör du försöka att inte luta dig framåt, eftersom kontrastvätskan har högre densitet än ryggmärgsvätska och rinner mot den lägst belägna punkten. Du bör inte heller köra bil under samma period.

Sticket i ryggen innebär en risk för postspinal huvudvärk, dvs. huvudvärk vid upprätt position som går över när man lägger sig ned. Huvudvärken går oftast över av sig själv inom ett par dagar, men om du skulle uppleva besvärande huvudvärk kan du höra av dig till den läkare som beställde undersökningen.