

# Antibiotikabehandling vid gallvägssjukdomar

## Kolangit och kolecystit

Gallan är normalt steril och infektioner i gallvägar är som regel sekundär till gallsten eller annat avloppshinder som tumör. Det är tarmbakterier som då etablerar sig i gallvägarna. Det kan ta några dagar innan en förstagångs kolecystit är infekterad. Den kan utvecklas till empyem eller nekrotisk inflammation och perforation. I koledokus med avloppshinder kan infektionen snabbt bli livshotande. **Grundbehandling är dränage** av galla.

## Behandling av kolangit eller konservativt behandlad kolecystit

Dränage via röntgen.

Inf. Tazocin 4g x 3 (täcker enterokocker som finns hos 30%).

## Behandlingstid

10 dagar (kan bytas till tablett vid bra svar).

## Vid byte till peroral behandling

1: hand: T. Spektramox 500mg x 3 + T. Flagyl 400mg x 3

Vid PC-allergi byt Spektramox till Ciproxin.

## Kolecystektomi

### Patient med någon riskfaktor, osäkert steril i gallblåsa eller operation med buköppning

Tabl Eusaprim forte 1 x 1, tabl Flagyl 400 mg 3 x 1 operationsdagens morgon eller 2 timmar före operationsstart.

### Akut kolecystektomi (oavsett skopi eller tomi)

Inf Eusaprim 10 mg + inf Flagyl 1,5 g 30 min före operationsstart.

### Elektiv laparoskopisk kolecystektomi utan riskfaktorer

Ingen profylax.

## ERCP - Endoskopisk retrograd choledochoskopi

### Vid kolangit

Inj Tazocin 4 g x 3 iv.

### Vid gallstas med ökad infektionskänslighet

Tabl Eusaprim forte 1 x 1 + tabl Flagyl 400 mg 3 x 1 operationsdagens morgon eller 2 timmar före operationsstart.

### Utan gallstas

Ingen profylax.

## **PTC - Percutan transhepatisk cholangiografi (rtg läk)**

Tabl Eusaprim forte 1 x 1 + tabl Flagyl 400 mg 3 x 1 ges 2 timmar före undersökningen.

Om patienten ej kan äta bra – Inf Eusaprim 10 mg + inf Flagyl 1,5 g före avfärd till röntgenavdelningen.

### **Allergi mot Trimetoprim eller Sulfa**

Byt Eusaprim mot Doxyferm 200 mg, iv eller tabl.