

Patientinformation

Läkemedel inför operation, Region Norrbotten

Om du inte fått instruktioner om hur du skall ta dina läkemedel, av din operatör eller narkosläkare, skall du följa det som står i detta dokument.

Blodförtunnande läkemedel: Trombyl 75 eller 160mg kan du ta till och med dagen innan operation.

Om du regelbundet medicinerar med de blodförtunnande medlen Waran, Pradaxa, Ticlide, Eliquis, Plavix (clopidogrel), Brilique samt Xarelto skall du rådgöra med din operatör och ansvarig läkare för den blodförtunnande medicineringen. Persantin kan du ta som vanligt.

Smärtstillande läkemedel: en del smärtstillande läkemedel kan ha blodförtunnande effekt. De medicinerna ska avslutas innan operationen

14 dygn innan operationen: Alganex eller Brexidol.

7 dygn innan operation: Bamyil, Magnecyl, Aspirin, eller Treo.

5 dygn innan operationen: Naproxen, Pronaxen, Naprosyn, Alfoxen, Albyl minor, Meloxicam, Tradil eller Celebra.

3 dygn innan operationen: Asasantin retard eller Orudis retard.

1 dygn innan operation: Voltaren, Diklofenak, Ipren, Brufen, Ibumetin, Relifex eller Orudis.

Lämpliga alternativa smärtstillande mediciner utan blodförtunnande effekt är Alvedon, Citodon, Panodil, Tradolan, Tramadol, Arcoxia eller Palexia.

Läkemedel för hjärta, blodfetter och blodtryck:

Följande läkemedel tas **INTE** operationsdagens morgon: Enalapril, Renitec, Lisinopril, Ramipril, Triatec, Cozaar, Losartan, Diovan, Valsartan, Aprovel, Irbesartan, Atacand, Candesartan och Micardis.

I övrigt ska du ta övriga läkemedel för hjärta, blodtryck och blodfetter.

Läkemedel mot magsår och magbesvär: ta Losec, Omeprazol, Pantoloc, Lanzo, Nexium, Pariet eller motsvarande som vanligt operationsdagen.

Diabetesläkemedel:

2 dygn före operation: ta **INTE** Metformin (Metformin, Glucophage och Avandamet).

Operationsdagen:

Ta **INTE** dina diabetestabletter operationsdagen.

Ta **INTE** insulin innan du kommer till sjukhuset om du opereras på förmiddagen. Är operationen planerad till efter 13.00 kan du ta ditt morgoninsulin till frukosten som äts före 07:00 (det gäller bara om du åker hem samma dag som du opereras). Narkospersonalen kommer att kontrollera och sköta ditt blodsocker under operationen.

Läkemedel mot astma och KOL: ta läkemedel och inhalationer som vanligt inför operationen. Du bör också ta med dina inhalatorer till operationsavdelningen. Har du CPAP för natten, ta med den till sjukhuset.

P-piller och östrogen: Om du ska göra en operation där du förväntas ligga kvar på sjukhuset över natten efteråt bör man avsluta dessa 4 veckor före operationen. Detta för att minska risken för blodproppar. Vid operationer där du går hem samma dag, kan du fortsätta ta dina hormonpreparat som vanligt, då har du inte den risken, om inte annat anges.

Hälsopreparat/Naturläkemedel d.v.s. allt som köps på apotek, butik eller via TV/media utsätts 14 dagar före operationen.

Huvudprocess Preoperativ process	Ansvarig Per Marcusson	Processledare Ann Charlotte Högström	Sida 1 av 2
Dokumenttyp Patientinformation	Dokument-Id CAREACTNSU-3-681	Godkänt datum 2018-12-19	Version 8.0



Läkemedel vid Reumatiska sjukdomar: om du fått läkemedlet av annan orsak än inflammatorisk ledsjukdom bör ordinerande läkare/klinik kontaktas före utsättning. Detta gäller speciellt patienter som är transplanterade där ordinerande klinik alltid ska tillfrågas innan ändring görs i patientens ordinationer.

Dessa substanser sätts inte ut (alt. uppehåll operationsdygnet)

Apremilast
Azatioprin
Ciklosporin
Guld
Hydroxiklorin
Klorokinfosfat
Leflunomide
Metotrexat
Mykofenolatmofetil
Natriumaurotiomalat
Sulfasalazin

Exempel på läkemedel

Otezla®
Imurel®
Sandimmun®

Plaquenil®
Klorokinfosfat Recip®
Arava®

CellCept®
Myocristin®
Salazopyrin®

Läkemedel som sätts ut

Cimzia®
Cosentyx®
Enbrel®
Humira®
Kineret®
Leukeran®
Mabthera®
Orencia® intravenöst
Orencia® subcutant
Remicade®
RoActemra® intravenöst
RoActemra® subcutant
Sendoxan®
Simponi®
Stelara®

Sätts ut

2 veckor
4 veckor
1 vecka
2 veckor
1 vecka
2 veckor
> 16 veckor
4 veckor
1-2 veckor
8 veckor
4 veckor
1-2 veckor
2 veckor
4 veckor
12 veckor

Återinsättning av ovanstående läkemedel 1-2 veckor efter operationen men tidigast när såret är helt läkt.

Övrig ordination utifrån din operation (inhalationer, ögondroppar och andra specifika läkemedel):

Har du frågor om dina läkemedel är du välkommen att höra av dig till det sjukhus/mottagning som planerar din operation.

Sunderby sjukhus: Dagkirurgisk enhet, telefon 0920 – 28 23 98

Piteå sjukhus: respektive kliniks mottagning via växeln telefon 0911 – 750 00

Gällivare sjukhus: Dagkirurgisk enhet, telefon 0970 – 191 13

Huvudprocess Preoperativ process	Ansvarig Per Marcusson	Processledare Ann Charlotte Högström	Sida 2 av 2
Dokumenttyp Patientinformation	Dokument-Id CAREACTNSU-3-681	Godkänt datum 2018-12-19	Version 8.0

