

Patientinformation pregabalin

Varför får du läkemedel mot epilepsi?

Pregabalin används mot olika former av epilepsi, dvs krampsjukdomar, men är även godkänt och väl prövat vid olika typer av smärta.

Hur verkar antiepileptika?

En av pregabalins effekter är en dämpning av smärtsignalerna i nervsystemet. Det i sin tur ger en reduktion av smärtan. Effekten på smärtan kommer successivt och kan vara fördröjd i någon/några veckor efter att du kommit upp i ”din” dos.

Biverkningar som kan förekomma

OBS! Försiktighet med bilkörning rekommenderas under behandlingen pga försämrad reaktionsförmåga. Pregabalin kan ge en del biverkningar. De vanligaste biverkningarna är trötthet, lätt yrsel, magkatarr, nedsatt synförmåga, dubbelseende, lätt svullnad runt hand- och fotleder och viktuppgång. Oftast går de flesta biverkningar över när du kommit upp i lämplig terapeutisk dos.

Doseringsschema

Dag	Morgon	Eftermiddag	Kväll
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Om du upplever en positiv effekt i form av mindre smärta, ökad aktivitetsförmåga trots smärta eller bättre sömn kan upptrappningen fortsätta enligt doseringsschemat.

Utvärdering av effekten under upptrappning av dosen gör du tillsammans med din läkare på det sätt som ni kommit överens om.