

## Städ- och desinfektionsschema vid smitta

Se rutindokument för respektive smitta för mer information. Riskbedömning av patient med riskfaktorer ska alltid göras.

Smittämne	Punktdesinfektion <sup>1</sup> vid spill och stänk av kroppsvätskor inkl. blodspill	Patientnära ytor/tagytor <sup>2</sup> i mottagningsrum, vårdsal och hygienutrymme		Golv
		Daglig städning, även mottagning inkl. FTV	Slutstädning <sup>3</sup>	Daglig- och slutstädning
<b>Antibiotikaresistenta bakterier</b> MRSA, VRE, ESBL, ESBLcarba	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	Allrengöringsmedels-impregnerad mopp alt. engångsduk allrengöring
<b>Tarmsmitta orsakad av virus</b> Calici (Noro/Sapo), Rota m.fl.	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid <sup>4</sup>	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid <sup>4</sup>	<b>Klorduk<sup>5</sup></b>	Allrengöringsmedels-impregnerad mopp alt. engångsduk allrengöring + Slutstäd: <b>klorduk<sup>5</sup></b>
<b>Clostridioides difficile</b>	<b>Klorduk<sup>5</sup></b> vid spill av feces Annat spill: Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	Hygienutrymme städas med <b>klorduk<sup>5</sup></b> Övriga ytor städas med Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	<b>Klorduk<sup>5</sup></b> Hygienutrymme städas dagligen med med klorduk fram till <b>48 timmar efter diarréerna upphört</b>	Låt golvet torka innan avtorkning med <b>klorduk<sup>5</sup></b>
<b>Tuberkulos Mässling Vattkoppor Influensa och Covid-19</b>	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid	Alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid <b>Luftburen smitta</b> Tuberkulos, Mässling, Vattkoppor - ställtid 2 timmar innan slutstäd. <b>Ambulans</b> vädras /korsdrag i 15 minuter, klar att använda efter städning.	Allrengöringsmedels-impregnerad mopp alt. engångsduk allrengöring

<sup>1</sup> **Punktdesinfektion:** Vårdpersonal ska direkt torka upp spill och stänk av kroppsvätskor inkl. blodspill och sen torka med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid eller klorduk vid virus virusorsakad tarmsmitta.

<sup>2</sup> **Patientnära ytor/tagytor:** Ytor som är i direktkontakt med patienten och ytor som ofta berör med händerna ex. säng/brits, stolar, sängbord, dörrhandtag, toalettstol, handfat, kranar, belysningsknapp etc.

<sup>3</sup> **Slutstädning:** Vårdpersonalen rengör och desinfekterar all flergångsutrustning och allt flergångsmaterial.

<sup>4</sup> Vid **virusorsakad tarmsmitta** används enbart Meliseptol® Pure, upphandlat i Region Norrbotten.

<sup>5</sup> Desinfektion med **Klorduk** skall föregås av rengöring av ytan med allrent, universalduk eller alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid. Ytan skall vara torr mellan rengöring och klorduk!