

Trombosprofylax vid kirurgi

Trombosprofylax ordineras av läkare och ska ges till högriskpatienter eller patienter med riskfaktorer.

Högriskpatient definieras enligt följande riskfaktorer:

- Malignitet
- Tidigare DVT/LE
- Operation för obesitas (BMI > 40)
- Känd koagulationsrubbnings
- Operation med laparotomi medellinjesnitt

Eller minst 2 av övriga riskfaktorer:

- >60 år
- Pre op blodtransfusion
- Pre op vårdtid > 6 dagar
- Op tid > 90 min
- Venösa bensår
- P-piller
- Obesitas
- Reop inom 30 dagar
- Hjärtsvikt
- Juvenil diabetes
- Graviditet
- DVT hos nära släkting
- Pares i nedre extremitet
- Pre op infektion eller sepsis
- Östrogenbehandling

Trombosprofylax ska ges med lågmolekylärt heparin (LMH) t.ex. Innohep

LMH verkar genom att förstärka antitrombins inhiberande effekt på faktor Xa och trombin.

Dosen bör ej administreras på operationsdagens morgon då det kan ge upphov till ökade blödningskomplikationer.

Behandling

1:a hand 4500 IE Innohep 10 dgr. Ges tidigast 6 timmar efter operation.