Val av skyddsutrustning vid luftvägsmitta (om patient bedöms smittsam)

Se sista kolumnen för tuberkulos (TBC), mässling, vattkoppor

	VÅRDSITUATION / OMVÅRDNAD				
Skyddsutrustning Val efter riskbedömning	**Avstånd mer än 2 meter** Till exempel: • Samtal	**Kontakt med patient / patientens säng och närliggande utrustning** Till exempel: • Av- och påklädning • Bädda säng • Såromläggning	**Risk för kontakt med <u>stora mängder</u> kroppsvätskor** Till exempel: • Diarré • Kräkningar	**Vid vårdmoment med förhöjd risk för smitta (tidigare aerosol-genererande procedurer)** Till exempel: • BiPAP, CPAP • HLR • Sugning av luftvägar utan slutet sugsystem • Trakeostomivård	**Vid TBC, mässling & vattkoppor**
Basala hygienrutiner	JA	JA	JA	JA	JA
Plastförkläde utan ärm	NEJ	JA	NEJ	JA	JA
Plastförkläde med lång ärm	NEJ	NEJ	JA	NEJ	NEJ
Stänkskydd: visir /skyddsglasögon	NEJ	JA	JA	JA	JA
Stänkskydd: munskydd klass IIR	NEJ	JA	JA	NEJ	NEJ
Andningsskydd FFP3 **	NEJ	NEJ / JA **	NEJ / JA **	JA	JA
Skyddshandskar	NEJ	NEJ / JA *	JA	NEJ / JA *	NEJ / JA *

* Använd skyddshandskar vid risk för kontakt med kroppsvätskor.

** **<u>Inom 2 m</u>** vid misstänkt/konstaterad smittsam covid 19 eller influensa om kontakt en längre tid (riktmärke kontakt med patienten mer än 1 timme per arbetspass). För val av andningsskydd, se Andningsskydd