

Till dig som behandlas med SGLT2-hämmare vid diabetes, hjärtsvikt, njursvikt

Mitt läkemedel heter: _____

SGLT2-hämmare är läkemedel som används vid behandling av typ 2-diabetes, men också vid hjärtsjukdom eller njursjukdom.

Det är viktigt att du pausar behandlingen med din tablett SGLT2-hämmare vid följande tillstånd:

- Vid risk för uttorkning, t ex vid magsjuka eller diarré
- Allvarlig infektion med hög feber
- Inför större operationer
- Diet med lågt kolhydratinnehåll eller fasta
- Svår hjärt-, lung-, leversjukdom

Påbörja inte behandlingen igen förrän du åter mår bra och har kunnat äta och dricka ordentligt efter din infektion/operation. Kontakta vid behov din klinik/hälsocentral för råd.

En mycket sällsynt komplikation med SGLT2-hämmare är syraförgiftning (ketoacidosis). Risken för detta ökar vid svält, plötslig minskning av insulin dosen samt vid ett ökat behov av insulin på grund av sjukdom, operationer eller alkoholmissbruk.

Symtom vid syraförgiftning (ketoacidosis):

- Magsmärtor
- Illamående, kräkningar
- Kraftig törst
- Andningssvårigheter
- Sötaktig/acetondoftande andedräkt
- Trötthet, medvetandepåverkan

Vid ovanstående symtom ska du direkt uppsöka vården. Berätta att du har behandling med SGLT2-hämmare. Syraförgiftning kan enkelt undersökas genom att kontrollera ketoner i blod och urin. Blodsockernivån kan vara normal vid detta tillstånd.

Kontakt vid frågor

Klinik/hälsocentral: _____ Telefon: _____