

Checklista A4 Läkarylåtande elrullstol

Arbetsterapeutens samråd med läkare

Nedanstående riktlinjer gäller vid förskrivning av elrullstol.

Förskrivningsrätt: Arbetsterapeut i samråd med läkare

Kriterier för förskrivning: Eldriven rullstol kan förskrivas vid stor* eller total* nedsatt d450 förmåga att gå* och behov finns av d465 att förflytta sig med hjälp av utrustning* för d460 att röra sig omkring på olika platser* när andra förflyttningssätt enligt nedanstående kriterier inte är tillräckliga för förflyttning i den dagliga livsföringen.

Kriterier:

- behovet av förflyttning ska inte kunna tillgodoses av andra förflyttningshjälpmedel såsom manuell rullstol, rollator, käppar o dyl.
- behovet att förflytta sig med elrullstol ska vara frekvent (flera gånger i veckan) och regelbundet
- patienten ska själv kunna framföra rullstolen utan fara för sig själv eller annan
- elrullstol för inomhusanvändning kan förskrivas när andra förflyttningshjälpmedel inte tillgodoser behovet
- vid förskrivning av elrullstol för utomhusanvändning ska andra förflyttningssätt i den dagliga livsföringen, t.ex. cykel, buss, bil eller färdtjänst tas i beaktande

Läkarens uppgift i samrådet:

Samrådet mellan arbetsterapeut och läkare kan kommuniceras muntligt eller skriftligt.

Arbetsterapeut behöver uppgifter om faktorer som kan vara kontraindicerande för att göra sin bedömning om elrullstol ska förskrivas. Inget läkarintyg ska skrivas.

Som läkare ska du ta ställning till om patientens medicinska, kognitiva och psykologiska status kan vara något hinder för att framföra elrullstol på ett säkert sätt.

Viktigt är att beakta säkerhetsaspekter och ta ställning till eventuella kontraindikationer.

Patienten ska kunna framföra elrullstolen självständigt bland andra människor och i trafik utan fara för sig själv eller andra.

Faktorer som kan vara kontraindicerande för förskrivning av elrullstol:

- Bör patienten röra på sig i stället för att sitta i elrullstol?
- Har patienten något av följande som kan påverka förmågan att framföra elrullstol?
 - Kognitiv funktionsnedsättning, till exempel nedsatt spatial förmåga, neglect, koncentrationssvårigheter, nedsatt omdömesförmåga eller simultankapacitet
 - Synnedsättning, t.ex. synskärpefunktioner, synfältsfunktioner
 - Hörselnedsättning
 - Epilepsi

- Psykisk sjukdom
- Progredierande sjukdom
- Intellektuell funktionsnedsättning- utvecklingsstörning
- Läkemedel eller annan behandling/Missbruksproblematik

Om du som läkare anser att förskrivning inte kan ske enligt gällande riktlinjer t.ex. att elrullstol inte kan framföras på ett säkert sätt ska det framgå i samrådet med arbetsterapeut.

*ICF erbjuder en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa. Klassifikationen kompletterar ICD-10.