

## Information till patienter som undersökts med röntgenkontrastmedel som injicerats i blodbanan

### *Drick efter undersökningen*

Kontrastmedlet utsöndras via njurarna och försvinner ur kroppen på cirka 24 timmar. För att underlätta denna utsöndring bör Ni dricka ett glas (cirka 2 dl) vätska var timme så länge Ni är vaken under första dygnet efter undersökningen.

OBS! Detta gäller ej om Ni lider av hjärtsvikt, njursvikt eller annat tillstånd som lett till att Ni ordinerats att begränsa Ert intag av vätska.

### ***Om du tar medicin som innehåller metformin och blir omedd att ta nytt blodprov efter röntgenundersökning***

Ni skall börja ta tablettorna igen *tidigast* två dygn efter undersökningen, men först skall njurfunktionen kontrolleras genom ett blodprov (t.ex. kreatinin).

Du ska därför beställa tid på din hälsocentral för provtagning som bör göras **2 dygn efter undersökningen**. Kontakta sedan din mottagning för att få veta om provresultatet är normalt och om du kan återuppta medicineringsen.

### ***Allergisk senreaktion***

I sällsynta fall kan kontrastmedlen ge upphov till allergisk reaktion, vanligast hudutslag och/eller klåda, inom något eller några dygn efter undersökningen. I allmänhet är dessa symtom lindriga och försvinner spontant utan behandling.

Om Ni mot förmodan skulle få en sådan reaktion (eller något annat symptom), som är besvärande, kan ni ta kontakt med Er läkare, sjukvårdsupplysningen, primärvården eller akutmottagningen.

Glöm inte att berätta att Ni varit på en röntgenundersökning och fått röntgenkontrastmedel insprutat i blodbanan.