

HÖK för bräckbandsbehandling vid Ljumsnbräck



Överenskommelse mellan primärvården och kirurgin i Norrbotten

Bakgrund

Ljumsnbräck hos män med ringa eller inga symtom behöver inte åtgärdas kirurgiskt. Risken för inklämning är vid dessa bräcktyper mycket låg. Alla kvinnor med ljumsnbräck bör dock erbjudas operation, oavsett om symtom föreligger eller inte, eftersom kvinnor har hög andel primära femoralbräck med högre risk för inklämning.

Icke kirurgisk behandling

Vid symtomatiska ljumsnbräck kan bräckbandage beställas när patienten

- inte vill opereras
- på grund av comorbiditet inte bör opereras
- behöver lindring av besvär i väntan på operation

Beställning av bräckband

Den enhet som bedömer att patienten inte skall genomgå operation beställer bandaget från länsservice (se länkar nedan).

Endast patienter där man efterfrågar operationsbedömning behöver remitteras till kirurgmottagningen. Patienter som ej har någon effekt av de standardbräckband eller med bräck i olika storlekar/anatomiska förhållanden där standard bandage inte passar och man gör bedömning att det är en patient som ej är aktuell för kirurgi skall remitteras till ortopedteknikern.

Praktiska tips

[Riktlinjer för behandling med bräckband](#)

[Bäckenmätning](#)

[Exempel på bräckband](#)