

Val av skyddsutrustning vid misstänkt / konstaterad covid-19

Uppdaterad: 2021-05-21. Foto: Simon Eliasson. Grundmaterial av Region Uppsala.

GÄLLER FÖR:
KOMMUNAL VÅRD

Skyddsutrustning	VÅRDSITUATION / OMVÅRDAD				
	Avstånd mer än 2 meter Till exempel: • Samtal	Ingen risk för kontakt med kroppsvätskor Till exempel: • Av- och påklädning • Bädda säng • Kontrollera blodtryck och puls	Risk för kontakt med kroppsvätskor samt vid stickande och skärande moment Till exempel: • Blodprov • Bädda säng • Personlig hygien • Provtagning övre luftvägar • Sårömläggning	Vid risk för mycket spill / stänk av kroppsvätskor (omfattar även luftvägssekret) Till exempel: • Helkroppsskötning • Fysioterapi Kraftig utsöndring av kroppsvätskor Till exempel: • Diarré • Kraftig hosta • Kräkningar	Moment innanför säkerhetsavståndet som är smittförande aerosolgenererande procedurer (AGP) Till exempel: • BiPAP, CPAP • HLR • Sugning av luftvägar utan slutet sugsystem • Trakeostomivård
Basala hygienrutiner	JA	JA	JA	JA	JA
Plastförkläde utan ärm	NEJ	JA	JA	NEJ	NEJ
Plastförkläde med lång ärm	NEJ	NEJ	NEJ	JA	JA
Stänkskydd: visir / skyddsglasögon	NEJ	JA	JA	JA	JA
Stänkskydd: munskydd klass IIR, klass II	NEJ	JA	JA	JA	NEJ
Andningsskydd FFP2, FFP3	NEJ**	NEJ**	NEJ**	NEJ**	JA
Skyddshandskar	NEJ	NEJ	JA	JA	JA*



* Vid risk för kontakt med kroppsvätskor (omfattar även luftvägssekret) använd skyddshandskar.

** vid arbete i någon annans hem

Arbetsmiljöverket föreskriver sedan 7 maj 2021 för arbete som utförs i någons hem att arbetsgivaren ska göra en riskbedömning av arbetsmiljön avseende ventilationsförhållanden och risken för begränsad luftburen smitta och i förekommande fall bruk av andningsskydd.

