

Olumiant/Baricitinib

Vad är Olumiant?	Olumiant tillhör gruppen januskinashämmare (också kallade JAK-hämmare) och är en medicin som har en inflammationshämmande effekt och som verkar genom att bromsa immunförsvaret. Olumiant verkar genom att aktiviteten av enzymet januskinas sänks i kroppen och då minskas inflammation vid reumatoid artrit.
Varför skall jag ta Olumiant?	Den bromsar inflammation och kan därför minska svullnad, värk och stelhet i leder samt minska trötthet och även bromsa skadeverknin g av brosk och ben i lederna. På så sätt kan det underlätta för dig i dina vardagliga aktiviteter och öka din livskvalité.
Hur lång tid tar det innan Olumiant ger effekt?	Full effekt förväntas efter drygt 4 månader.
Hur många tabletter skall jag ta varje dag?	Olumiant tas en gång dagligen, se recept. Olumiant sväljs hel med ett glas vatten. Du kan ta den antingen med eller utan mat.
Har Olumiant några biverkningar?	Vanliga biverkningar är illamående, ont i magen, infektioner, huvudvärk, påverkad blodbild, förhöjda blodfetter, förhöjt lever- eller CK-värden, hudutslag och akne. Se bipacksedeln för övriga biverkningar. Om biverkningar skulle uppträda kontakta Reumatologmottagningen alt. din Hälsocentral. Vid eventuell allergisk reaktion eller kraftiga buksmärtor skall du söka vård akut.
Hur ofta behöver jag lämna kontrollblodprover när jag behandlas med Olumiant?	Du lämnar blodprover på din hälsocentral en gång per månad i tre månader, därefter var tredje månad. Blodprovsremiss är upplagd i datorn så personalen på din hälsocentral (eller specialistmottagningen om du bor i Piteå) ser vilka prover som skall tas. Däremot måste Du själv ha kontroll på hur ofta prover skall lämnas och boka provtagnings tid. Tre månader efter start med Olumiant ska du lämna blodprov för blodfetter som är fasteprover , d.v.s. du skall inte äta eller dricka fr.o.m. kl. 20 kvällen före din provtagning. Receptförnyelse sker endast om provtagningsföreskriften följs. Är proverna bra hör du inget från oss.
Kan jag ta andra läkemedel tillsammans med Olumiant?	Meddela alltid din läkare om Du tar andra läkemedel innan du påbörjar behandling med Olumiant. Fortsättning på nästa sida →

Vad gör jag när jag får en infektion?	Vid infektionstecken som t.ex. feber, allmän sjukdomskänsla, hosta m.m. gör Du ett uppehåll med Olumiant och vänder Dig vid behov till din hälsocentral. Om Du äter antibiotika/penicillin skall Du också göra ett uppehåll de dagarna Du tar antibiotika.
Vag gör jag med Olumiant om jag skall opereras?	Du skall göra uppehåll med Olumiant en vecka före planerad operation och 1-2 veckor efter eller till såret är läkt. Om infektion uppstår blir uppehållet längre.
Kan jag vaccinera mig under Olumiantbehandling?	Alla vaccinationer med avdödade virus som t.ex. influensavaccin kan tas under behandling. <i>Du skall ej vaccinera dig med ett levande/försvagat vaccin. Kontakta din reumatolog om detta skulle bli aktuellt.</i>
Kan jag ta Olumiant under graviditet och amning?	Fertila kvinnor och män skall använda effektivt preventivmedel under behandling och minst 7 dagar efter avslutad behandling med Olumiant. Olumiant skall inte heller användas under amning.
Vid frågor kontakta	Mottagningsköterskan via tel. 0920-28 39 90 alternativt via internet 1177.se , nås även via www.norrbotten.se