

Salazopyrin EN / SULFASALAZIN

Vad är Salazopyrin?	Salazopyrin dämpar inflammation som förekommer bl.a. vid reumatiska led- och ryggsjukdomar. Om du är överkänslig mot sulfa och salicylater ex TREO, Magneeryl, Trombyl, så ska du inte ta Salazopyrin
Hur lång tid tar det innan Salazopyrin ger effekt?	Som regel märker man inte någon skillnad förrän efter 2-4 månader, lederna blir mjukare och mindre svullna och/eller att inflammatorisk stelhet i ryggen/bäckenet minskar.
Hur många tabletter skall jag ta varje vecka?	Det är mycket viktigt att Du tar Salazopyrin precis som din läkare har ordinerat. Tabletterna intas hela. Tala med Apotekspersonal varje gång du hämtar ut tabletterna för information om de ska tas vid matintag eller ej. FÖLJ DOSERING PÅ RECEPTET. Vanlig dosering är följande: 1:a veckan: 1 tabl. på kvällen 2:a veckan: 1 tabl. morgon och 1 tabl. kväll 3:e veckan: 1 tabl. morgon och 2 tabl. kväll Från 4:e veckan och framöver: 2 tabl. morgon och 2 tabl. kväll
Har Salazopyrin några biverkningar?	De flesta som behandlas med Salazopyrin tål medicinen väl. En del biverkningar såsom huvudvärk, yrsel, smakförändringar illamående, tinnitus, hosta, lös avföring, hudutslag och klåda, leverpåverkan, artralgi, benmärgshämning samt feber och ont i halsen kan förekomma. Om biverkningar skulle uppstå kontakta reumatologmottagningen alternativt din hälsocentral. Biverkningarna är oftast dosberoende och går över vid uppehåll eller dosminskning. Regelbundna blodprovskontroller fångar upp ev. ogynnsam påverkan på blodbilden.
Hur ofta behöver jag lämna kontrollblodprover när jag behandlas med Salazopyrin?	Du lämnar blodprover på din hälsocentral varannan vecka i tre månader därefter var 6:e månad. Blodprovsremiss är upplagd i datorn så personalen på din hälsocentral ser vilka prover som skall tas. Däremot måste Du själv ha kontroll på hur ofta prover skall lämnas och boka provtagningstid. Receptförnyelse sker endast om provtagningsföreskriften följs. Är proverna bra hör du inget från oss.
Vad gör jag med Salazopyrin när jag får en infektion eller skall opereras?	Vid feber under de första tre behandlingsmånaderna gör Du ett uppehåll med Salazopyrin och vänder Dig till hälsocentralen för bedömning. Om Du äter antibiotika/penicillin behöver Du inte göra uppehåll med Salazopyrin de dagarna Du tar antibiotika. Du behöver inte göra uppehåll med Salazopyrin i samband med en operation.
Kan jag ta Salazopyrin under graviditet och amning?	Du kan ta medicinen under graviditet och amning. Prata med din läkare när frågan blir aktuell. Du kan behöva justera din dos och eventuellt få börja med folsyra under din graviditet. Salazopyrin kan minska fertilitet hos män dock inte kvinnor. Detta är dock övergående och försvinner när man slutar med läkemedlet.
Vid frågor kontakta	Mottagningssköterskan via tel. 0920-28 39 90 alternativt via internet 1177.se – Vårdguidens e-tjänst nås även via www.norbotten.se

Huvudprocess Reumatologiska och immunologiska sjukdomar	Ansvarig Karin Lindmark	Processledare Susanne Sundvall	Sida 1 av 1
Dokumenttyp Patientinformation	Dokument-Id VARD-5-2236	Godkänt datum 2022-08-25	Version 6.0