

SANDIMMUN/CIKLOSPORIN

Vad är Sandimmun?	Sandimmun är medicin som har en inflammationshämmande effekt och som verkar genom att bromsa immunförsvaret.
Varför skall jag ta Sandimmun?	Den bromsar inflammation i olika organsystem och minskar bl.a. svullnad, ömhet och stelhet i lederna.
Hur lång tid tar det innan Sandimmun ger effekt?	Effekten av behandlingen kan komma redan efter 1-2 månader, ibland dröjer det upp till 4 månader.
Hur många tabletter skall jag ta varje dag?	Sandimmun tas morgon och kväll dvs. två ggr per dygn. Kapslarna tas hela och kan tas med andra läkemedel eller måltid. Ta inte Sandimmun tillsammans med grapefrukt eller grapefruktjuice. Dygnsdosen beräknas efter kroppsvikten.
Har Sandimmun några biverkningar?	En del patienter får illamående, diarré, muskelsmär, infektioner, hudförändringar, huvudvärk, trötthet, stegrad blodtryck. Ovanliga biverkningar är lever- och njurpåverkan. Biverkningarna är oftast dosberoende och går över vid dosminskning. Det föreligger ökad risk för hudtumörer, varför extra försiktighet med solning rekommenderas. Om biverkningar skulle uppträda kontakta Reumatologmottagningen alt. din Hälsocentral.
Hur ofta behöver jag lämna kontrollblodprover när jag behandlas med Sandimmun?	Du lämnar blodprover på din hälsocentral varannan vecka i tre månader sedan en gång/månad i tre månader därefter var tredje månad. Blodprovremiss är upplagd i datorn så personalen på din hälsocentral ser vilka prover som skall tas. Däremot måste Du själv ha kontroll på hur ofta prover skall lämnas och boka provtagningstid. Kontroll av blodtrycket en gång/månad tre första månaderna. Receptförnyelse sker endast om provtagningsföreskriften följs. Är proverna bra hör du inget från oss.
Kan jag ta andra läkemedel tillsammans med Sandimmun?	Meddela alltid din läkare om Du tar andra läkemedel innan du påbörjar behandling med Sandimmun.
Vad gör jag när jag får en infektion?	Vid infektionstecken som t.ex. feber, allmän sjukdomskänsla, hosta m.m. gör Du ett uppehåll med medicinen och vänder Dig vid behov till din hälsocentral. Om Du äter antibiotika/penicillin skall Du också göra ett uppehåll de dagarna Du tar antibiotika.
Vag gör jag med Sandimmun om jag skall opereras?	Du kan fortsätta med sandimmun både innan och efter operation. Läkare kommer att informera Dig om annat gäller.
Kan jag ta Sandimmun under graviditet och amning?	Läkemedlet får användas under graviditet men ska inte användas vid amning. Diskutera med din läkare om frågan blir aktuell!
Vid frågor kontakta	Mottagningssköterskan via tel. 0920-28 39 90 alternativt via internet 1177.se , nås även via www.norrbotten.se

Huvudprocess Reumatologiska och immunologiska sjukdomar	Ansvarig Karin Lindmark	Processledare Susanne Sundvall	Sida 1 av 1
Dokumenttyp Patientinformation	Dokument-Id VARD-5-2233	Godkänt datum 2023-01-24	Version 6.0