

## Xeljanz/Tofacitinib

<b>Vad är Xeljanz?</b>	Xeljanz tillhör gruppen januskinashämmare (också kallade JAK-hämmare) och är en medicin som har en inflammationshämmande effekt och som verkar genom att bromsa immunförsvaret. Xeljanz verkar genom att aktiviteten av enzymet januskinas sänks i kroppen och då minskas inflammation vid reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.
<b>Varför skall jag ta Xeljanz?</b>	Den bromsar inflammation och kan därför minska svullnad och smärta och på så sätt öka din förmåga att utföra vardagliga aktiviteter.
<b>Hur lång tid tar det innan Xeljanz ger effekt?</b>	Full effekt förväntas efter drygt 4 månader.
<b>Hur många tabletter skall jag ta varje dag?</b>	Xeljanz finns både som filmdragerad tablett och depottablett, se recept för information om hur du skall ta ditt läkemedel. Xeljanz kan tas med eller utan mat. <b>Observera att om du fått utskrivet depottabletter så skall de sväljas hela och inte får delas, krossas, tuggas eller lösas upp.</b>
<b>Har Xeljanz några biverkningar?</b>	<p>Vanliga biverkningar är illamående, kräkningar, diarré, ont i magen, magkattarr, dyspepsi, infektioner, huvudvärk, högt blodtryck, ont i leder, svullnad i ben/fötter, påverkad blodbild, förhöjt CK-värde i blodet, hudutslag, och hosta. <i>Ovanliga biverkningar är t.ex. allvarliga överkänslighetsreaktioner, kontakta akut vård direkt om du skulle få denna typ av biverkan.</i> För övriga biverkningar se bipacksedeln.</p> <p>Om biverkningar skulle uppträda kontakta Reumatologmottagningen alt. din Hälsocentral.</p>
<b>Hur ofta behöver jag lämna kontrollblodprover när jag behandlas med Xeljanz?</b>	<p><b>Du lämnar blodprover på din hälsocentral</b> en gång per månad i tre månader, därefter var tredje månad. Blodprovremiss är upplagd i datorn så personalen på din hälsocentral (eller specialistmottagningen om du bor i Piteå) ser vilka prover som skall tas. Däremot måste Du själv ha kontroll på hur ofta prover skall lämnas och <b>boka provtagningstid.</b></p> <p><b>Tre månader efter start med Xeljanz ska du lämna blodprov för blodfetter som är fasteprover</b>, d.v.s. du skall inte äta eller dricka fr.o.m. kl. 20 kvällen före din provtagning.</p> <p><b>Receptförnyelse sker endast om provtagningsföreskriften följs. Är proverna bra hör du inget från oss.</b></p>
<b>Kan jag ta andra läkemedel tillsammans med Xeljanz?</b>	<p>Meddela alltid din läkare om Du tar andra läkemedel innan du påbörjar behandling med Xeljanz eftersom vissa läkemedel tillsammans med Xeljanz kan öka risken för biverkningar, infektioner och andra läkemedels effekt.</p> <p style="text-align: right;">Fortsättning på nästa sida →</p>

<b>Vad gör jag när jag får en infektion?</b>	Vid <b>infektionstecken</b> som t.ex. feber, allmän sjukdomskänsla, hosta m.m. <b>gör Du ett uppehåll</b> med medicinen och vänder Dig vid behov till din hälso-central. Om Du äter antibiotika/penicillin skall Du också göra ett uppehåll de dagarna Du tar antibiotika.
<b>Vag gör jag med Xeljanz om jag skall opereras?</b>	Du skall göra uppehåll med Xeljanz en vecka före planerad operation och 1-2 veckor efter eller till såret är läkt. Om infektion uppstår blir uppehållet längre.
<b>Kan jag vaccinera mig under Xeljanzbehandling?</b>	Alla vaccinationer med avdödade virus som t.ex. influensavaccin kan tas under behandling.  <i>Du skall ej vaccinera dig med ett levande/försvagat vaccin. Kontakta din reumatolog om detta skulle bli aktuellt.</i>
<b>Kan jag ta Xeljanz under graviditet och amning?</b>	Fertila kvinnor och män skall använda effektivt preventivmedel under behandling och minst 28 dagar efter avslutad behandling med Xeljanz. Xeljanz skall inte heller användas under amning.
<b>Vid frågor kontakta</b>	Mottagningsköterskan via tel. <b>0920-28 39 90</b> alternativt via internet <b>1177.se</b> , nås även via <a href="http://www.norrbotten.se">www.norrbotten.se</a>