

Patientinformation amitriptylin

Varför får du ett läkemedel mot depression?

Amitriptylin kan användas vid depression, men då i betydligt högre doser än när det används vid smärta. Läkemedlet är även godkänt och väl prövat vid olika typer av långvariga smärttillstånd.

Hur verkar amitriptylin?

En av amitriptylins effekter är en dämpning av smärtsignalerna i nervsystemet. Det i sin tur ger en reduktion av smärtan. Läkemedlet kan även ha effekt på sömnen med förbättrad sömnkvalitet. Effekten på smärtan kommer successivt och kan vara fördröjd i någon/några veckor efter att du kommit upp i ”din” dos.

Biverkningar som kan förekomma

Amitriptylin kan ge en del biverkningar, framförallt i början av behandlingen. De vanligaste biverkningarna är muntorrhet, morgontrötthet och lätt yrsel. Morgontröttheten kan förebyggas genom att dosen tas tidigare på kvällen. Muntorrhet kan öka risken för karies, varför det är extra viktigt med god munvård. Vid besvärande muntorrhet kan fuktande munspray, sugtablett eller gelé rekommenderas.

Doseringsanvisning

Startdosen ska vara lägsta möjliga och kan trappas upp en gång/vecka i samråd med din läkare till dess att du uppnått en dos som ger dig god sömn och smärtlindring, men utan obehagliga biverkningar. Med en gradvis ökning av dosen undviker du att bli alltför trött de första dagarna.

Utvärdering av effekten under upptrappning av dosen gör du tillsammans med din läkare på det sätt som ni har kommit överens om.