

Till dig som medicinerar med metformin

Metformin är förstahandsbehandling vid typ 2 diabetes. Medicinen har en god blodsockersänkande effekt och förebygger diabeteskomplikationer. Metformin finns även i många kombinationsalternativ.

Viktigt att känna till om metformin

Risk vid vätskebrist

Det finns risk för en allvarlig biverkan (mjölksyraförgiftning) av metformin vid tillstånd med vätskebrist. Denna risk ökar vid hög ålder eller nedsatt njurfunktion.

Brist kan uppstå vid:

- Ökade vätskeförluster, exempelvis vid kräkningar och diarréer, feber, stark värme.
- Bristande vätskeintag

I situationer med vätskebrist bör man därför **göra uppehåll med metformin!**

Röntgenundersökningar med kontrastmedel

- Kontrastmedel kan ge nedsatt njurfunktion som ökar risken för mjölksyraförgiftning vid metforminbehandling.
- Behandling med metformin kan tillfälligt behöva avbrytas inför röntgenundersökning med kontrastmedel. Prata med din läkare.

Vid tveksamhet i en risksituation enligt ovan ska man kontakta sin diabetessköterska, behandlande läkare eller 1177 Vårdguiden, telefon 1177.

Läkemedelskommittén Region Norrbotten

Källa: Janusinfo.