

Vävnadsprov i munnen (biopsi)

Det är relativt vanligt med förändringar i munnens slemhinnor. Det kan handla om skavsår från proteser, trauma mot kinder och tunga via frekventa påbitningar, olika hudsjukdomar som ger förändringar/inflammation i munnen, överkänslighetsreaktioner mot tandfyllningsmaterial med mera.

För att få en säker diagnos som grund för behandling tas vävnadsprov (biopsi) som insändes till analys med mikroskop.

Du blir bedövd med vanligt bedövningsmedel och sedan lägger vi gröna dukar över bröst och hår för att minska risken för infektion.

Vävnadsprovet utförs och såret sluts oftast med ett eller ett par stygn. Ingreppet är alltså lindrigt och görs oftast direkt på mottagningsrummet.

Efter biopsin

De flesta har inte några större besvär efter ingreppet. Men med alla ingrepp hur små de än är finns det ändå risker. Normalt har man inte någon direkt värk efteråt, möjligen en måttlig ömhet i såret när bedövningen släpper. Smärtstillande tabletter brukar inte vara nödvändiga men vid behov kan du ta 1-2 tabletter av typ Alvedon/Panodil/Pamol. Såret kan ibland blöda lite det första dygnet efter biopsi.

Under de första dagarna kan du komplettera tandborstningen med ParoEx, Corsodyl eller Flux Klorhexidin munskölj (dessa produkter finns receptfritt på apotek).

I samband med biopsier i känsliga områden (vävnadsprov från läppar) finns en liten risk för känselstörning eller känselbortfall i en avgränsad del av över/underläppen (ca 1 % patienter som gör detta ingrepp drabbas). Rörelseförmågan i läppen påverkas inte och det är inget som syns. Detta kan dock upplevas störande. I många fall kan känselstörningen försvinna. Det kan dock ta upp till 1-2 år.

Rökning i samband med ett kirurgiskt ingrepp ökar risken för komplikationer, till exempel försämrad sårhäkning eller infektion. Vi rekommenderar därför starkt att du avstår från rökning, åtminstone under veckan efter biopsin. Receptfria nikotinersättning, till exempel nikotintuggummi finns att köpa på apotek.

Som patient har du rätt att ta ställning till hur ditt prov/dina prover får sparas i en biobank och även om det/de får användas i forskningsändamål. Om du samtyckt till att ditt prov/prover sparas, har du alltid rätt att ändra ditt beslut.

Suturborttagning

Oftast används stygn som lossnar av sig själva (efter ca 1 vecka) men ibland används lite starkare suturer som behöver klippas. Du beställer då själv tid hos din hemtandläkare/kliniken som tar bort suturerna efter ca **7-10 dagar**.

Efterkontroll

Efter ca 2 - 3 veckor får du och din tandläkare besked (per post eller telefon) om diagnosen/provsvar och den ytterligare behandling/kontroll som kan bli aktuell.

Vid eventuella frågor ta gärna kontakt med din tandläkare!

Huvudprocess Tandvård; Oral kirurgi; Oral medicin; Parodontologi	Ansvarig Angelika Lantto	Processledare Konstantin Sarkissov	Sida 1 av 1
Dokumenttyp Patientinformation	Dokument-Id VARD-5-5410	Godkänt datum 2020-04-03	Version 5.0