

## Rutindokument

Arbetsområde, t ex klinik	Godkänd av	Sida 1 av 2
Godkännadatum	Ansvarig för uppdatering	Version

[Klinik och diagnostik](#) [Differentialdiagnos](#) [Indikationer för åtgärd](#) [Åtgärd](#)

### Klinik och diagnostik

Hudöverskott övre och/eller nedre ögonlock. Ofta tillsammans med protrusion av orbital fettvvd.  
Vanligen åldersrelaterat. Successivt svagare orbikularismuskel tillsammans med nedsatt elasticitet i subkutan vävnad leder till veck och överhängande ögonlockshud.  
Familjär predisposition är vanligt men ärftliga faktorer finns inte beskrivna.  
Ingen rasskillnad.

### Differentialdiagnos

**PTOS:** Det är önskvärt om bedömning inför ställningstagande till åtgärd innehåller uppgifter om:

*Levatorfunktion* (ULE = Upper Lid Excursion).  
Normal levatorfunktion >12 mm.  
Viss funktionsnedsättning 6-11 mm  
Dålig levatorfunktion < 5 mm.

*MRD* (=Margo Reflex Distsance).  
Normalt: 4 – 4,5 mm.  
Mild funktionsnedsättning: 2 mm  
Moderat funktionsnedsättning: 3 mm  
Uttalad funktionsnedsättning: > 4 mm.

#### *Vertikal fissurhöjd*

Margo övre ögonlock normalt ca 2 mm ovan limbus.  
Margo nedre ögonlock täcker normalt limbus med ca 1 mm.  
Män 7-10 mm  
Kvinnor 8-12 mm.

#### *Lokalisation av övre ögonlocksfåran*

Bestäms med blicken nedåt.  
Män: 8 mm.  
Kvinnor: 10 mm.

**OBSERVERA:** Snabbt påkommen ptos i kombination med mios ev med trauma mot halsregionen och/eller intrakraniellt pulssynkront



## Rutindokument

Arbetsområde, t ex klinik	Godkänd av	Sida 2 av 2
Godkännadatum	Ansvarig för uppdatering	Version

blåsljud inte sällan hos yngre individer skall handläggas som vid ipsilateral carotidisdissektion för att undvika stroke.

Fotodokumentation kan vara av värde.

**Blefarochalasis:** Idiopatisk, familjär sjukdom karakteriserad av intermittenta episoder av ögonlocksödem hos yngre vilket resulterar i överskott av förtunnad och veckad ögonlockshud

## Indikationer för åtgärd

### Övre ögonlock

- Uttalat överhäng ned över ögonfransarna med kraftigt reducerat synfält.
- Eksem och sårbildning i hudveckan kring lat kanthalregionen
- Kosmetik: Relativ indikation. Operationer av enbart kosmetiska skäl utförs inte inom ramen för skattefinansierad sjukvård.

### Nedre ögonlock

- Excessiv fettvävsprotrusion.
- Dislokation av nedre glasögonbågen med refraktionssvårigheter.
- Kosmetik: Relativ indikation. Operationer av enbart kosmetiska skäl utförs inte inom skattefinansierad sjukvård.

## Åtgärd

Vanligen kirurgisk. Se operationsrutin med bildbeskrivning [CBB10](#).

Undvik:

**Överkorrektion** vilket kan ge:

- Lagofthalmos med risk för expositionskeratit.
- Ektropion.

**Underkorrektion:**

- Missnöjd patient.

