

HÖK Rosacea och perioral dermatit



Allmänläkarkonsulterna

Överenskommelse mellan primärvården
och hudmottagningen i Norrbotten

Behandling

- Starta behandling med Rozex kräm/gel eller motsvarande preparat.
- Om ingen effekt efter 3 månaders behandling, byt till Finacea eller Soolantra.
- Propyless som mjukgörande vid behov.
- Informera patienten om potentiellt försämrande faktorer: Sol, värme, kyla, blåst, starka kryddor, heta drycker, alkohol, stress och olika irriterande krämer och kemikalier på huden.
- Ifall konsekvent lokalbehandling enligt ovan inte ger tillfredsställande effekt kombinera lokalbehandlingen med Tetralysal kapslar 300 mg x 2 i 3 månader alt kapslar Oracea som doseras 1x1 (dock ej rabatterat) i dos enligt FASS.
- Fortsatt lokalbehandling krävs för att hålla sjukdomen under kontroll.

Remiss till hudmottagningen

Vid svåra besvär, där behandling enligt ovan, trots konsekvent utförd, inte har gett resultat, för ställningstagande till Isotretinoin.

Huvudprocess Hud	Ansvarig Francisc Masec, Adriana Herrera Gonzales	Processledare Anna Beck	Sida 1 av 1
Dokumenttyp Vårdrutin	Dokument-Id VARD-5-3575	Godkänt datum 2018-06-12	Version 3.0