

## Antikoagulantia och läkemedel som kan orsaka käkbensnekroser - lathund

**Vid oklarheter kontaktas alltid Tandvårdens kompetenscentrum**

### Att tänka på:

NOAK	
<p><b>Påverkar sekundära hemostasen</b></p> <p>– Justera ej dos, kort halveringstid 9-13 tim. Går ej att mäta med pK-INR</p> <p>Behandla pat på eftermiddagen om morgondos tas och på förmiddagen vid kvällsdos; dvs så långt från dostillfället som möjligt.</p>	<p><b>Pradaxa</b> (dabigatran)</p> <p><b>Xarelto</b> (rivaroxaban)</p> <p><b>Eliquis</b> (apixaban)</p> <p><b>Lixiana</b> (edoxaban)</p>

Trombocythämmare	
<p>– <b>Påverkar primära hemostasen</b></p> <p>– Initialt högre dos, t.ex. 300 mg, och ibland i kombination. Underhållsdos 75 mg.</p> <p>– Vid dubbla trombocythämmare, ta kontakt med ansvarig läkare för ev. utsättning av endera preparat.</p> <p>– Var uppmärksam på om NSAID tagits, vilket ökar blödningsrisken.</p>	<p><b>Trombyl, Acetylsalisylsyra</b> (acetylsalicylsyra)</p> <p><b>Plavix, Clopidogrel</b> (klopidogrel)</p> <p><b>Efient, Prasugrel</b> (prasugrel)</p> <p><b>Brilique</b> (tikagrelor)</p>

Vitamin K-antagonist
<p><b>Warfarin</b> (waran) pK-INR max 2,8 (taget senast dagen före ingrepp).</p>

Heparin-gruppen (spruta)	
<p><b>Påverkar sekundära hemostasen.</b></p> <p>– Kort halveringstid, utför ingrepp så nära nästa injektion som möjligt, tidigast 12 timmar efter senaste injektionen.</p>	<p><b>Fragmin</b> (dalteparin)</p> <p><b>Heparin</b> (heparin)</p> <p><b>Klexane, Enoxaparin</b> (enoxaparin)</p> <p><b>Innohep</b> (tinzaparin)</p> <p><b>Orgaran</b> (danaparoid)</p>

Bisfosfonater	
<p><b>Risk för käkbensnekros vid:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tablettform, veckotablett &gt;3år (promillerisk)</b></li> <li>• <b>Injektion pga. malignitet (&lt;10%).</b></li> </ul> <p><b>Veckotablett i kombination med annan immunsupprimerande mdicinering och/eller nedsatt allmäntillstånd, medför ökad risk för käkbensnekros.</b></p>	<p><i>Hanteras inom allmäntandvården: (remiss till Specialisttandvården om läkning ej erhållits efter 4 veckor).</i></p> <p><b>Alenat, Alendronat, Binosto, Fosastad, Fosavance, Tridepos</b> (Alendronsyra)</p> <p><b>Optinate Septimum, Risedronat</b> (Risedronsyra)</p> <p><b>Ibrandronat, Bondronate</b> (Ibandronsyra)</p> <p><i>Remiss till Tandvårdens kompetenscentrum vid intag av:</i></p> <p><b>Bonefos</b> (Klodronat)</p> <p><b>Pamifos, Pamidronatdinatrium</b> (Pamidronat)</p> <p><b>Aclasta, Zerlinda, Zometa</b></p> <p><b>Zoledronsyra</b> (Zoledronsyra)</p>

Exempel på övriga läkemedel vid behandling av malignitet som kan ge käkbensnekros
<p><b>Prolia, XGEVA</b> (Denosumab) – avvakta 6 mån med behandlingar som påverkar käkbenet.</p> <p><b>Proteinkinashämmare: L01XE enl. FASS ATC-register</b></p>