

Antikoagulantia och läkemedel som kan orsaka käkbensnekroser - lathund

Vid oklarheter kontaktas alltid Tandvårdens kompetenscentrum

Att tänka på:

NOAK	
<p>Påverkar sekundära hemostasen</p> <p>– Justera ej dos, kort halveringstid 9-13 tim. Går ej att mäta med pK-INR</p> <p>Behandla pat på eftermiddagen om morgondos tas och på förmiddagen vid kvälldos; dvs så långt från dostillfället som möjligt.</p>	<p>Pradaxa (dabigatran)</p> <p>Xarelto (rivaroxaban)</p> <p>Eliquis (apixaban)</p> <p>Lixiana (edoxaban)</p>

Trombocythämmare	
<p>– Påverkar primära hemostasen</p> <p>– Initialt högre dos, t.ex. 300 mg, och ibland i kombination. Underhållsdos 75 mg.</p> <p>– Vid dubbla trombocythämmare, ta kontakt med ansvarig läkare för ev. utsättning av endera preparat.</p> <p>– Var uppmärksam på om NSAID tagits, vilket ökar blödningsrisken.</p>	<p>Trombyl, Acetylsalisylsyra (acetylsalicylsyra)</p> <p>Plavix, Clopidogrel (klopidogrel)</p> <p>Efient, Prasugrel (prasugrel)</p> <p>Brilique (tikagrelor)</p>

Vitamin K-antagonist
Warfarin (waran) pK-INR max 2,8 (taget senast dagen före ingrepp).

Heparin-gruppen (spruta)	
<p>Påverkar sekundära hemostasen.</p> <p>– Kort halveringstid, utför ingrepp så nära nästa injektion som möjligt, tidigast 12 timmar efter senaste injektionen.</p>	<p>Fragmin (dalteparin)</p> <p>Heparin (heparin)</p> <p>Klexane, Enoxaparin (enoxaparin)</p> <p>Innohep (tinzaparin)</p> <p>Orgaran (danaparoid)</p>

Bisfosfonater	
<p>Risk för käkbensnekros vid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tablettform, veckotablett >3år (promillerisk) • Injektion pga. malignitet (<10%). <p>Veckotablett i kombination med annan immunsupprimerande mdicinering och/eller nedsatt allmäntillstånd, medför ökad risk för käkbensnekros.</p>	<p><i>Hanteras inom allmäntandvården: (remiss till Specialisttandvården om läkning ej erhållits efter 4 veckor).</i></p> <p>Alenat, Alendronat, Binosto, Fosastad, Fosavance, Tridepos (Alendronsyra)</p> <p>Optinate Septimum, Risedronat (Risedronsyra)</p> <p>Ibrandronat, Bondronate (Ibandronsyra)</p> <p><i>Remiss till Tandvårdens kompetenscentrum vid intag av:</i></p> <p>Bonefos (Klodronat)</p> <p>Pamifos, Pamidronatdinatrium (Pamidronat)</p> <p>Aclasta, Zerlinda, Zometa</p> <p>Zoledronsyra (Zoledronsyra)</p>

Exempel på övriga läkemedel vid behandling av malignitet som kan ge käkbensnekros
<p>Prolia, XGEVA (Denosumab) – avvakta 6 mån med behandlingar som påverkar käkbenet.</p> <p>Proteinkinashämmare: L01XE enl. FASS ATC-register</p>