

Hörntand i överkäken som inte bryter fram eller som skadat framtand

Bakgrund

Frambrottet för hörntänder i överkäken sker hos de flesta vid 12-13 års ålder. Det varierar hos olika individer och kan ske vid 10 års ålder eller vid 16 års ålder och är ändå helt normalt. Vid tandläkarundersökning bedöms bl.a. patientens bettyp, bettutveckling och om hörntänderna i överkäken har en god position för frambrott. Vid misstanke om att en hörntand inte har en god placering eller riskerar att skada en framtand utförs vidare utredning.

Orsaker

Anledningen till att hörntänder inte bryter fram normalt eller har en frambrottsriktning som skadar en annan framtand kan bero på platsbrist, ärftlighet eller att tandanlaget har en felaktig placering vid bildandet.

Utredning

När en hörntand har ett försenat frambrott eller inte kan kännas tydligt i munnen så undersöker tandläkaren kliniskt och med röntgen. Beroende på diagnos beslutas om fortsatt behandling.

Behandling

Felaktig frambrottsriktning

Om hörntanden har en avvikande frambrottsriktning är det vanliga att intilliggande mjölkänder tas bort. Därefter fortsätter man att bevaka hörntandens frambrott med röntgen halvårsvis för att kontrollera så att tanden kommer fram som den ska.

Skadad framtand eller tand som inte bryter fram

I de fall där hörntanden inte bryter fram eller där den skadar en annan framtand finns det olika val av behandling. Är det trångt i bettet kan den skadade tanden eller hörntanden avlägsnas. Vid behov av luckslutning utförs detta med tandställning. Är det glest i bettet kan hörntanden föras på plats med tandställning efter att en operation är genomförd där en guldkedja fästes på hörntanden.