

Interaktion Nystimex (nystatin) och Waran (warfarin)

Syfte

Att få en enhetlig och patientsäker rutin för patienter som behandlas med Waran (warfarin) och Nystimex (nystatin).

Gäller för

Samtlig personal inom Folktandvården Norrbotten.


Bakgrund

En potentiell viktig interaktion har upptäckts mellan Waran (warfarin), som är ett potent blodförtunnande läkemedel, och Nystimex (nystatin) mixtur som används vid lokal behandling av pågående svampinfektion i munhålan.

Samtidig behandling kan, hos vissa individer, öka den antikoagulativa effekten av warfarin och därmed öka risken för blödningsbiverkningar. Noggrann monitorering av INR/PK - värde rekommenderas. Warfarindosen kan behöva minskas markant (med cirka 30 %). Oftast pågår den antifungala behandlingen med Nystimex sköljning under 4 till 6 veckor så det är relevant att INR-värde hålls under kontroll och uppsikt under dessa veckor. Som tur är håller datajournalen (VAS) koll på möjliga interaktioner om man skriver recept via LM modullen.

Interaktion C2

När ett recept utformas i LM modullen på Nystimex och patienten står på Waran så dyker det upp en gul knapp med **Interaktion C2** symbolen och varnar att det föreligger en möjlig ”krock” mellan respektive läkemedel. Genom att klicka på gula ”Interaktion”-knappen kommer man vidare i programmet och får mer information om potentiella ”krocken” och vad man behöver tänka på.



Aktuella				
Datum	Inr	Klin	Substans	Läkemedel
190627	Tand	Paro	Kortikosteroider för lo→	(APL) KLOBETASOL APL
190322	ÖRVC	ÖRVC	Loppfrö och vitt loppfrö	LUNELAX
190701	Tand	Paro	Nystatin	NYSTIMEX
190322	ÖRVC	ÖRVC	Kalcium, kombinationer →	CALCICHEW-D3 CITRON
190322	ÖRVC	ÖRVC	Warfarin	WARAN

Interaktion Warfarin – Nystatin. Praktisk hantering inom tandvården i Region Norrbotten:

Nystatin Oral suspension 100000 IE/ml (Nystimex) används inom tandvården vid oral candidiasis. Det finns en risk att nystatin kan interagera med warfarin och öka den antikoagulerande effekten och därmed öka risken för blödningsbiverkningar.

Vid förskrivning av nystatin till en warfarin-behandlad patient där behandlingen med nystatin beräknas pågå över en vecka:

- Be patienten gå och ta ett PK-prov efter ca en vecka från insättningsdatumet. Om patienten själv inte är ansvarig för sin läkemedelshantering – informera då den som är det t ex kommunsjuksköterska alt. anhörig.