

Anafylaktisk reaktion, vuxen – Jokkmokks hälsocentral

Den allergiska reaktionen kan utvecklas snabbt, inom några minuter, och kräver omedelbar behandling!

- Stadium 1:** Omgående efter kontakt med utlösande agens (min-en timme)
- oro, obehagskänsla, diffus klåda, illamående
- Stadium 2:** Urticaria, angioödem, andningssvårigheter pga ödem och astma, tachycardi, lågt blodtryck
- Stadium 3:** Chock: Snabb och ytlig andning, blek hud, kallsvett, snabb och trådfin puls, blodtrycksfall, medvetanderubbning

Behandling

Skapa lugn och lägg patienten med höjd fotända.

Fri luftväg, undvik dock irritation av luftvägarna!

Syrgas 10-12 L på reservoarmask.

Allergisk reaktion utan anafylaxi

- T. **desloratadin** 5 mg, 1 st po.
- T. **betametason** 0,5 mg, 10 tabl, po. Löses i vatten.

Anafylaxi

- Inj. **adrenalin** 1 mg/ml, 0,3-0,5 ml **im**. Detta upprepas var 5:e minut vid behov.
- Inf. **Ringer-Acetat** iv, i snabb takt.
- Inj. **betametason** 4mg/ml, , 2ml iv. alt inj **Solu-Cortef** 100 mg, 100-200 mg långsamt iv (im).
- T. **desloratadin** 5 mg, 2 st po (när patienten kan medverka).

Vid utebliven effekt av upprepade intramuskulära adrenalininjektioner och cirkulatorisk kollaps med medvetandepåverkan ges:

- Inj. **adrenalin** 0,1 mg/ml, 1-3 ml iv. Ges långsamt (1 ml/minut) **med**

EKG-övervakning!

-Vid luftvägsobstruktion: Inhalation **Ventoline** 2 mg/ml, 5 ml. Om utebliven effekt inhalation **Adrenalin** 1 mg/ml, 2 ml. Kan upprepas efter 2-5 min.

Huvudprocess Allergi	Ansvarig Peter Olsson	Processledare Charlott Ek	Sida 1 av 2
Dokumenttyp Vårdrutin	Dokument-Id CAREINVSOM-3-766	Godkänt datum 2021-01-11	Version 4.0

Specifik övervakning

Rytmövervakning

Tänk på

Adrenalin intramuskulärt ges på liberal indikation vid misstänkt anafylaxi. Adrenalin är ett mycket potent läkemedel och kan medföra stora risker när det ges intravenöst.

Hastig uppresning av patient med anafylaxi kan leda till livshotande blodtrycksfall

Alla patienter med anafylaxi SKALL transporteras till sjukhus för observation. Detta gäller även patienter som erhållit adrenalin före ambulansens ankomst.

Huvudprocess Allergi	Ansvarig Peter Olsson	Processledare Charlott Ek	Sida 2 av 2
Dokumenttyp Vårdrutin	Dokument-Id CAREINVSOM-3-766	Godkänt datum 2021-01-11	Version 4.0