

Hembehandling med subcutan immunglobulin

Hembehandling

Immunglobulinbehandling kan skötas hemma genom att man med hjälp av en bärbar pump ger immunglobulin som infusion i underhudsfettet på buken eller på låren. Metoden är väl beprövad och ett enkelt och säkert sätt att tillföra gammaglobulin. Hur mycket immunglobulin som ges beror bland annat på kroppsvikten. Oftast räcker det med ett infusionstillfälle/vecka men det kan anpassas individuellt.

Uppstart av behandling

När Du ska starta behandling får du träna behandlingstekniken på infektionsmottagningen tillsammans med en sjuksköterska som är speciellt kunnig i immunbristsjukdomar. Du kommer till mottagningen en gång per vecka under 6 veckor. Dessa tillfällen är nödvändiga och obligatoriska, dels för att vi skall se att inga oönskade effekter uppstår, och dels för att du skall bli helt säker på tekniken och känna trygghet inför behandlingen. Varje besök tar ca 3-4 timmar. Ät en ordentlig måltid innan och drick gärna lite extra. Efter de 6 veckorna övergår du till att ta din behandling hemma, vanligtvis en gång per vecka.

Material och läkemedel

Immunglobulin ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Oftast kommer man direkt upp till detta vid första uttaget på Apoteket.

Sprutor, kanyler och pump skrivs ut på hjälpmedelskort och lämnas ut kostandsfritt via Apoteket. Övriga förbrukningsmaterial som kompresser och häfta köper du själv på Apoteket.

Återbesök

3 månader efter att du startat behandlingen kommer du att kallas till sjuksköterskebesök för att se att allt fungerar bra.

Efter 6 respektive 12 månaders behandling kallas du till återbesök hos läkare med provtagning och eventuell anpassning av behandlingsdosen.

Behandlingstid

Normalt gör man ett behandlingsförsök på 18 månader, följt av ett lika långt behandlingssuppehåll för utvärdering av behandlingens effekt. Vid svårare immunbrist kan livslång behandling krävas. Din läkare informerar dig angående vad som är aktuellt i ditt fall.

Allmänt om immunglobulin och information om biverkningar

Immunglobulin är ett koncentrat av IgG-antikroppar som är en viktig del i immunförsvaret för att bekämpa olika smittämnen. Läkemedlet utvinns ur blodplasma från mänskliga blodgivare. Noggranna tester genomförs. Det finns inget syntetiskt alternativ. Medlet innehåller varken kvicksilver eller konserveringsmedel. Vanliga biverkningar är svullnad, ömhet, rodnad och värmekänsla i huden på injektionsställena. Re-

aktionerna brukar avta när man vant sig vid behandlingen. Man kan även få lätt huvud- och ryggvärk i samband med behandlingen.

Viktigt att tänka på: *Feber över 38 grader – INGEN BEHANDLING.* Vänta tills febern har gått ner. Detta gäller även om du känner dig mer sjuk än vanligt.

Om frossa och klåda med hudreaktion uppkommer under pågående behandling - **stoppa infusionen.** Kontakta sjukvården för råd.

Om bröstsmärtor, hjärtklappning, plötsligt kraftigt illamående, svimningskänsla, plötslig kraftig kropps värk, plötslig klåda i munnen och/eller handflator/fotsulor. Andnings svårigheter-**stoppa infusionen och ring 112 för akut omhändertagande.**

Det är mycket viktigt att Du fyller i infektionsdagboken så att behandlingseffekten kan utvärderas. Det kan ta flera månader innan effekt uppnås och det gäller att ha tålamod.

Vill du kontakta oss ring 0920-283986

Informationen om den planerade behandlingen och behandlingstiden är utlämnad och delgiven.

Patient

Läkare

.....

.....