

# Hepatit C - Leverbiopsi, indikation och rutin

## Berörda enheter

Infektionsmottagningen, Sunderby sjukhus.

## Syfte

Tillhandahålla en tydlig rutin för leverbiopsi i samband med till exempel hepatit.

## Indikationer

Leverbiopsi för PAD kan övervägas till exempel inför beslut om behov av uppföljning HCC-screening hos patienter med kronisk hepatit C-infektion. Biopsin tas för att kartlägga inflammationsgrad och fibrosstadium och bör utföras till exempel hos patienter där levertäthetsmätning med Fibroscan® varit svårtolkad eller att det finns kliniska, röntgenologiska (vid ex ultraljud) eller labmässiga (ex. trombocytopeni) hållpunkter för fibrosutveckling. Framför allt hos patienter som har varit virusbärare under många år eller har andra konkurrerande sjukdomar som kan snabba på sjukdomsförloppet för hepatiten.

## Kontraindikationer

- Blödningsrubbning
- Uttalat lungemfysem (kan utgöra risk för oavsiktlig lungpunktion)
- Oförmåga att hålla andan i minst 10 sekunder eller att följa instruktioner
- Pat talar bara annat språk än svenska eller engelska om inte tolk finns med under ingreppet
- Pågående missbruk

## Rutiner leverbiopsi Sunderby sjukhus

Förberedelser inför leverbiopsi enligt PM från röntgenavdelningen Sunderby sjukhus.

## Förslag premedicinering

Premedicinering inför leverbiopsi ordineras restriktivt – blir sällan aktuellt.

Om premedicinering behövs kan diazepam (ex T. Stesolid) 10 mg användas. Dosen ges 30-60 minuter innan ingreppet.

## Övervakningslista leverbiopsi

Se nästa sida! Lista för utskrift.

## Övervakningslista leverbiopsi.

Datum: .....

### GLÖM INTE!

- Hämta ordination från den behandlande läkaren avseende eventuell premedicinering. Premedicinering ska ges en halv till en timme före ingreppet!
- Kontrollera att APTT och PK är taget!
- Ta med etikett via PAD- remissen. OBS! Sänd EJ remissen!

Blodtryck/puls före biopsin .....

Pvk satt kl ..... PVK utsatt kl .....

Premed: .....

Tid premedicinering given: .....

Eventuell Infusion: .....

Kontrollera patienten varje halvtimme de första 2 timmarna!

Därefter 1 gång per timme fram till hemgång.

Kl.	Bltr	Puls	Andn.fr.	Bukkoll	Sign.