

# Neuroleptika - uppföljning avseende biverkningar Barnkliniken Gällivare

Neuroleptika är en del i behandlingen av flera allvarliga psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar. Metabola, hormonella och neurologiska biverkningar är vanliga. Den här rutinen syftar till att säkerställa att uppföljning sker på ett adekvat sätt.

## Gäller för följande patienter:

- Patienter som planeras sättas in på neuroleptika via BUP
- Om behov av akut insättning så får biverkningskontroller påbörjas efter startad behandling.
- Patienter som är insatta på neuroleptikabehandling på annan ort följer schemat utifrån hur länge de stått på behandling. Om kortare behandlingstid än en månad bör schemat följas som vid nyinsättning. Viktigt att begära journalkopior, inklusive provsvar, från tidigare behandlare.

**Neuroleptika:** Risperidon, aripiprazol, quetiapin, ziprasidon, olanzapin, klozapin

## På BUP:

- Uppsättes på bevakningslista hos sekreterare
- Remiss till barnmedicin för somatisk bedömning med anamnes för ärftlighet, rökning, och aktuell häsohistoria
- Livsstilsråd (kost, motion)
- Meddelande till barnmottagningen när behandling påbörjas så att kontroller kan planeras in och löpa på
- Utvärdera sömn, sedation, målsymtom och effekt, omgivningsfaktorer som kan påverka symtom, extrapyramidala, prolaktinrelaterade och andra biverkningar
- Vid utsättning meddelas barnmott så kontroller kan avslutas
- När behandling påbörjats följs behandling med regelbundna besök
- Informationsblad till patienten om biverkningar, kost och motion

## På Barnmedicin:

- Inför behandlingsstart besök till barnläkare med fullständigt status med endokrin/metabolt fokus. Provtagning enligt provtagningsschema. Remissvar till BUP.
  - Om klozapin ska även EKG kontrolleras
- När barnmottagningen meddelats att behandling påbörjats på BUP tas regelbundna prover enligt schemat.
- Normala provsvar meddelas inte om ej annan överenskommelse.
- Vid avvikande prover diskuterar barnläkare provsvar med behandlande läkare på BUP om ej behov av akut åtgärd. Om provsvar gör att det behövs akut åtgärd åligger det bakjouren på barnmedicin.

Vid behov kan patienten erhålla samtal om kost och motion på barnmottagningen, eventuellt tillsammans med dietist

# Provtagning uppföljning neuroleptikabehandling

Barnkliniken Gällivare-Kiruna

Arbetsblad – cirkulerar mellan mottagning och läkare tills regelbunden provtagning avslutas. Signeras av bakjouren enligt rutin. OBS! Stryk över prover som inte är aktuella.

Patient

Planerat datum	Prover som skall tas	Prov tagna datum	Sign tagna prov	Läkarsign bedömt prov	Kommentar
Före start	Längd, vikt, blodtryck, puls, fP-glukos, kolesterol, HDL, LDL, triglycerider, ASAT, ALAT <i>Om behandling med quetiapin: TSH</i> <i>Om behandling med klozapin: EKG</i> <i>Vid misstanke: prolaktin (morgonprov 12 h efter senaste neuroleptikados)</i>				
2 veckor	Längd, vikt				
1 månad	Längd, vikt, blodtryck, puls <i>Om behandling med klozapin: EKG</i> <i>Vid misstanke: prolaktin (morgonprov 12 h efter senaste neuroleptikados)</i>				
2 månader	Längd, vikt				
3 månader	Längd, vikt, blodtryck, puls, fP-glukos, kolesterol, HDL, LDL, triglycerider, ASAT, ALAT <i>Vid misstanke: prolaktin (morgonprov 12 h efter senaste neuroleptikados)</i>				
6 månader	Längd, vikt, blodtryck, puls, fP-glukos, kolesterol, HDL, LDL, triglycerider, ASAT, ALAT <i>Om behandling med quetiapin: TSH</i> <i>Vid misstanke: prolaktin (morgonprov 12 h efter senaste neuroleptikados)</i>				
O.s.v. var 6:e månad	Längd, vikt, blodtryck, puls, fP-glukos, kolesterol, HDL, LDL, triglycerider, ASAT, ALAT <i>Om behandling med quetiapin: TSH</i> <i>Vid misstanke: prolaktin (morgonprov 12 h efter senaste neuroleptikados)</i>				