

Behandling med botulinumtoxin, Dysport

Botulinumtoxin är ett nervgift som används vid behandling av överdriven svettning. Botulinumtoxin blockerar nervsignalen till svettkörtlarna och förhindrar svettning

- Botulinumtoxin injiceras ytligt i huden i många små doser, ca 20-30 stick i varje armhåla med en fin nål. Behandlingen tar ungefär 30 minuter
- Behandling ges inte vid graviditet, amning, muskelsjukdom, allergi mot botulinumtoxin samt vid medicinering med vissa läkemedel
- Vanliga biverkningar är ömhet och eventuellt blåmärken av stick, dessa är snabbt övergående
- Undvik rakning i armhålorna en vecka innan behandling, risk för små sår och irritation vilket gör att behandling inte kan ges
- Använd inte deodorant behandlingsdagen och en vecka efter behandlingen för att inte motverka effekten av botulinumtoxinet
- Undvik att tvätta armhålorna första dygnet efter behandling
- Undvik träning och bastubad två dygn efter behandling

Effekten av behandlingen brukar märkas av inom en vecka. Verkningsstiden är individuell och kan vara upp till ett år. Då effekten börjar avta är du välkommen att höra av sig för att sättas upp på väntelista för ny behandling. Upprepning av behandling kan vid behov erbjudas efter ungefär åtta månader.

Kontakt vid frågor:

Hudmottagningen, Sunderby Sjukhus 0920 - 28 39 85 eller logga in på 1177.se

Huvudprocess Hud	Ansvarig Adriana Herrera Gonzales	Processledare Marie Jonsson Edfast	Sida 1 av 1
Dokumenttyp Patientinformation	Dokument-Id VARD-5-5062	Godkänt datum 2025-03-20	Version 8.0