

Infliximab, checklista för patientinformation

Berörda enheter

Piteå sjukhus. Medicin- och rehabiliteringskliniken, Specialistmottagningen.

Muntlig information om Infliximab

Vad är Infliximab och hur fungerar det?

Infliximab är ett läkemedel som ges som infusion ("dropp") och det minskar inflammation och används till vissa patienter med Crohns sjukdom eller Ulcerös kolit. TNF- α är ett ämne som finns naturligt i vårt immunförsvar. Vid den inflammationen som pågår vid dessa sjukdomar finns ett överskott av TNF α . Infliximab binder sig till TNF- α och därigenom dämpas inflammationen.

Förväntad effekt av läkemedlet

Infliximab bromsar inflammationsförloppet. Effekten är individuell och kommer att utvärderas efter ett antal behandlingar och läkaren tar då ställning till om behandlingen ska fortsätta.

Hur ges Infliximab?

Infliximab ges som en intravenös infusion enligt lokalt PM för infusions- och observationstider.

Dosering, intervall

Man börjar med en behandling, nästa ges två veckor senare och efter ytterligare fyra veckor nästa behandling. Om behandlingseffekt ges vanligen behandlingen var åttonde vecka. Dosen beräknas efter patientens vikt.

Biverkningar och åtgärder

Under infusionen kan en del personer reagera med en relativt lindrig infusionsreaktion i form av feber, frossa, yrsel, klåda, värmekänsla eller blodtrycksfall. Dessa symtom kan ofta avhjälpas genom att man stänger av droppet en stund och ger behandling med läkemedel. I sällsynta fall kan allvarliga liknande reaktioner inträffa och medför då att behandlingen avbryts. Det är viktigt att patienten är medveten om vilka reaktioner som kan uppträda så att han/hon kan säga till tillgänglig vårdpersonal så tidigt som möjligt. En allergisk reaktion kan inträffa upp till tolv dagar efter infusionen.

Att observera

Patienten ska bedömas och observeras med avseende på infektion innan, under och efter behandling med Infliximab. Då man använder Infliximab kan infektionskänsligheten påverkas något.

Hämning av TNF α kan maskera symtom på infektion såsom feber.

Vid tecken på infektion som feber, ont i halsen, hosta, andfåddhet, sveda vid vattenkastning ska patienten kontakta mottagningen och/eller jourcentral alternativt akutmottagningen. Detta gäller även infektioner i små sår.

Huvudprocess Mage och tarm; Inflammatoriska systemsjukdomar; Inflammatoriska ledsjukdomar; Hud	Ansvarig Catarina Lysell Bergström	Processledare Catarina Lysell Bergström	Sida 1 av 2
Dokumenttyp Vårdrutin	Dokument-Id VARD-5-2200	Godkänt datum 2020-12-17	Version 5.0

Behandling med Remsima ska avbrytas om en patient utvecklar en allvarlig infektion eller sepsis.

Undvik piercing och håltagning samt tatuering då detta medför en ökad infektionsrisk. Om man ändå ska göra något av ovanstående ska det ske mitt emellan två behandlingar.

Remsima ska inte användas avancerad hjärtsvikt.

Vaccinationer

Man avråder ifrån att ta ”levande” vaccin vid behandling med Infliximab. Patienten ska alltid rådgöra med läkare innan vaccin tas.

Infliximab och andra läkemedel samt naturläkemedel

Läkare ska alltid informeras om alla mediciner patienten tar, receptfria och även naturläkemedel. (Information om specifikt naturläkemedel finns på läkemedelsverkets hemsida).

Operationer och tandingrepp

Inför planerad operation eller tandingrepp ska patienten rådgöra med läkare hur Infliximab ska användas. Den långa halveringstiden av Infliximab ska beaktas om ett kirurgiskt ingrepp planeras. En patient som kräver kirurgi och som står på Infliximab ska övervakas noggrant beträffande infektioner och nödvändiga åtgärder ska vidtas.

Graviditet och amning

Vid önskan om graviditet behöver patienten och läkaren planera på vilket sätt behandlingen ska fortsätta. Informera läkare omedelbart om graviditeten.

Vid önskemål om amning tar patienten kontakt med läkare.

Infliximab patientkort

Överlämna patientkort från företaget.

Skriftligt patientmaterial

Gå igenom det material som finns tillsammans med patienten.

Kontakt med sjuksköterska/läkare

Lämna telefonnummer och telefontider.

Provtagning och undersökningar

Under behandlingen kommer vissa prover och undersökningar att genomföras. Följ instruktionerna noga.

Återbesök

Boka eventuellt tid för läkarbesök och boka/planera för kommande infusion.

Huvudprocess Mage och tarm; Inflammatoriska systemsjukdomar; Inflammatoriska ledsjukdomar; Hud	Ansvarig Catarina Lysell Bergström	Processledare Catarina Lysell Bergström	Sida 2 av 2
Dokumenttyp Vårdrutin	Dokument-Id VARD-5-2200	Godkänt datum 2020-12-17	Version 5.0