

Måttlig överkänslighetsreaktion på kontrastmedel

Du har som patient reagerat med symtom och utslag efter att du genomgått en undersökning med kontrastmedlet

Sannolikt finns det ett samband med att Du fick en kontrastmedelsinjektion och dina symtom/utslag, men det kan också vara så att Du har reagerat på något annat och att det hela är ett tidsmässigt orsakssammanhang. Efter att Du fick Dina symtom/utslag så har vi gett dig en tablett/er

som mildrat dina symtom och klåda. Vi har nu observerat Dig under en tid här på avdelningen, men du kan nu gå hem utan att vidta några ytterligare åtgärder.

Skulle symtomen/utslagen återkomma så ring till vår avdelning, se nedan eller vid akut situation uppsök sjukhusets akutmottagning.

Vi kommer att dokumentera i vårt journalsystem att Du har fått en måttlig icke anafylaxi-reaktion. Inför en eventuellt kommande undersökning med kontrastmedel kommer Du att få ett annat kontrastmedel. Om du i samband med ny undersökning tillfrågas om tidigare reaktion på kontrastmedel så försök återge denna information så noggrant som möjligt. Detta är viktigt för att Du då skall få bästa möjliga diagnostik och behandling.

Kontakt vid frågor:

Telefonnummer: _____

Röntgenavdelningen, _____ Sjukhus

Signatur : _____