

Patientinformation vid extravasering av jodhaltiga röntgenkontrastmedel

Du har fått ett röntgenkontrastmedel som injicerades i ett blodkärl. I sällsynta fall kan det hända att kontrastmedlet inte rinner in i kärlet som avsetts utan läcker utanför ut i vävnaden.

Detta är tyvärr en komplikation som kan uppkomma och risken med detta kan inte alltid förutses.

Några tips om hur du kan minska eventuella besvär:

- Högläge av armen (ovanför hjärtnivå)
- Ispåse på extravaseringsstället 15-60min, 3 gånger per dag i 1- 3dagar eller till symtomlindring

Oftast är extravaseringen helt ofarlig med en lätt lokal smärta, som är vanligaste symtomet och brukar klinga av efter 2-4dagar.

Om smärtan ökar efter hand eller försämras bör du kontakta din vårdcentral under dagtid eller akutmottagning/ jourcentral på kvällar och helger. Uppge att du fått röntgenkontrastmedel där blodkärlet spruckit.

Symtom som kan uppkomma, där sjukvård bör kontaktas:

- Smärtan ökar efter hand
- Smärtan kvarstår efter 4 dagar
- Det uppstår blåsor eller sår i huden
- Hud rodnar eller missfärgas på annat sätt
- Vävnaden kring stickstället börjar kännas spänd
- Hudtemperaturen vid stickstället ändras
- Upplevelse av känselstörningar vid stickstället eller längre ut på armen