

Behandling med intravenöst immunglobulin

Behandlingen

Vissa patienter bedömes behöva behandling med intravenöst immunglobulin. Det innebär att läkemedlet tillförs direkt i blodet. Behandlingen kan ges på infektionsmottagningen, efter individuell bedömning ibland även på annat sjukhus eller på Hälso-central. Det vanligaste intervallet mellan behandlingarna brukar vara 3-4 veckor. Insättningen och doseringen av behandlingen ordineras alltid av patientansvarig läkare.

Allmänt om immunglobulin

Immunglobulin är ett koncentrat av IgG-antikroppar som är en viktig del i immunförsvaret för att bekämpa olika smittämnen. Läkemedlet utvinns ur blodplasma från mänskliga blodgivare. Noggranna tester utförs. Det finns inget syntetiskt alternativ. Medlet innehåller varken kvicksilver eller konserveringsmedel.

Vanliga biverkningar som kan uppstå är lätt huvudvärk och ryggvärk. För att förebygga dessa reaktioner så kan intag av vätska både före behandlingens start och under tiden den pågår ske. Droptakten kan också minskas så att huvudvärken lättar.

Behandlingstid

Vid ankomsten till mottagningen sätts en infart i en blodåder. Läkemedlet ges via en speciell pump och trappas upp sakta för att förebygga biverkningar.

Vill Du kontakta oss ring: 0920-28 39 86

Infektionskliniken, Sunderby sjukhus, 97180 Luleå