


Bilirubinkontroller på BB

Datum	2021-03-18	Antal sidor	1	Ersätter	2019-11-07
Skrevet av	Per Friskopp	Redaktör		Godkänt	Per Friskopp

Bilirubinmätning utförs för alla barn


Mätning utförs över bröstbenet med transkutanmätare. När och hur ofta bilirubin ska kontrolleras avgörs av nedanstående riskfaktorer. Undvik om möjligt att planera för kontroller nattetid när labb är stängt. Värden över 200 µmol/L verifieras med blodprov de första 48 timmarna, därefter behöver värden över 250 µmol/L verifieras.



Bilirubinjournal

Nyfödda ≥ v35

µmol/L



Vid värden i A-zon kontaktas jourhavande barnläkare.

Vid värden i B-zon tas patienten upp på nästkommande barnrond.

Barnet behöver inte kvarstanna på BB i väntan på bedömning av barnläkare, men föräldrarna ska informeras om att de kan behöva återkomma för kompletterande provtagning.

Normal kontroll utesluter inte utveckling av behandlingskrävande gulsot efter hemgång men risken torde minska kraftigt. Barn som följts på grund av stegrad bilirubin i a-zon bör följas tills värdet har sjunkit till <250 µmol/L.

Ref: Vårdprogram Neonatal Hyperbilirubinemi, Alken J et al; Andra upplagan 2019; Svenska Barnläkarföreningens Neonatalsektion