

Föräldrainformation om Midazolam-lugnande medicin i samband med behandling

Ditt barn har idag fått ett lugnande läkemedel för att underlätta behandling

Tänk på att

- Du och ditt barn får stanna kvar på akuten en stund efter avslutad behandling.
- Förutom att dämpa ängslan och oro ger medicinen även en muskel - avslappning. Medicinen sitter kvar i kroppen en tid efter avslutad behandling - även om Ditt barn förefaller helt återställt är balans och koordination påverkad, från några timmar upp till ett dygn efter avslutad behandling.
Håll därför Ditt barn under noggrann uppsikt och undvik tex. cykling, skridskor, inlinesåkning mm.
- Låt barnet sitta fastspänt med bälte i bilen bredvid en vuxen (dvs. fram om du är ensam med barnet) på hemresan.
- En av medicinens effekter är att Ditt barn ej minns alla detaljer i behandlingen. Det är därför bra om Du pratar med Ditt barn om vad som hänt i positiva ord.

Om Du har frågor, kontakta din ordinarie Hälsocentral eller Sjukvårdsupplysningen 1177

Huvudprocess Barnhälsovård	Ansvarig Magnus Tufvesson	Processledare Magnus Tufvesson	Sida 1 av 1
Dokumenttyp Patientinformation	Dokument-Id VARD-5-2531	Godkänt datum 2018-03-28	Version 5.0