

Vaccination mot influensa - generellt direktiv om läkemedelsbehandling

Avser influensavaccin: Fluzone HD (alt. Efluelda) Sanofi AB

Berörda enheter

Syfte

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling avseende vaccination mot influensa enligt HSLF-FS 2017:37

Influensavaccination enligt generellt direktiv om läkemedelsbehandling omfattar sjuksköterskor vid berörda enheter enligt ovan efter genomgången utbildning om vaccination vid influensa upprättad av Region Norrbotten.

Indikationer för influensavaccination

Sjuksköterskor som omfattas av de generella direktiven kan administrera influensavaccin till vuxna personer som saknar kontraindikation för influensavaccination med högdosvaccin. Vaccination mot influensa med högdosvaccin rekommenderas till personer bosatta på särskilt boendet för äldre och personer med hemsjukvård som är 60 år och äldre.

Kontraindikation

Innan ställningstagande till administrering av influensavaccin personen som önskar vaccination fylla i ” **Underlag för vaccination mot influensa**”.

Om personen anger överkänslighet mot ägg eller annan allergi/överkänslighet kontaktas behörig förskrivare (läkare) för bedömning och ev. ordination.

Läkare kontaktas om personen tidigare haft någon allvarlig reaktion (yrsel, svimning, andnöd eller utslag) i samband med vaccination.

Har personen någon behandling som kan påverka immunförsvaret ska de bedömas av sin specialistmottagning (t ex cytostatikamottagning, reumatologen m fl.) för ställningstagande till när i tid de bör få sin vaccination för bästa effekt.

Vid pågående infektion/feber bör vaccinationen senareläggas.

Läkemedel för behandling av anafylaxi eller annan överkänslighetsreaktion ska alltid finnas tillgänglig vid vaccination.

Dosering

Upphandlat högdosvaccin mot influensa 2021/2022:

Fluzone HD (alt. Efluelda) inj.vätska.

Vaccinet levereras i förfylld spruta utan nål.

Vaccinet ska till vuxna enligt indikation ges en gång per influensasäsong.

Dos vuxen person: 0,7 ml i första hand intramuskulärt i överarmens deltoideusmuskel, men kan vid behov ges subkutant i överarmen.

Vid behandling med blodförtunnande läkemedel som Waran eller likande ges vaccinet subkutant.

Dokumentation

Influensavaccination dokumenteras i VAS-journal och Svevac enligt gällande rutin.

Datum:

Medicinsk ansvarig läkare:

Namnförtydligande:

Det generella direktivet ska uppdateras och signeras inför varje influensasäsong.