

Inhalation 3% koksalt vid bronchiolit

Datum	2014-01-14	Antal sidor	1	Ersätter samma 2010-10-04
Skrevet av	=	Redaktör	=	Godkänt: Åke Stenberg

Indikation:

Bronchiolit

Barn med obstruktivt inslag behandlas parallellt med racepinefrin.

Beredning av 3% natriumklorid:

Dra ur 1,3 ml ur en 10 ml ampull sterilt vatten

Tillsätt 1,3 ml Addex Natriumklorid 235 mg/ml till resten (8,7 ml) vatten.

Blanda

Dosering:

Använd 4 ml 3% natriumklorid för en inhalation med Aiolos inhalationsutrustning

Upprepas vb 3 gånger per dygn eller enl ordination.

Ref:

Cochrane Database Syst Rev. 2008 Oct 8;(4):CD006458.

Nebulized hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in infants

J Pediatr. 2010 Oct;157(4):630-4, 634.e1. Epub 2010 Jun 19.

Nebulized 5% or 3% hypertonic or 0.9% saline for treating acute bronchiolitis in infants

Nebulized Hypertonic Saline Without Adjunctive Bronchodilators for Children With Bronchiolitis.

Pediatrics 2010;126:e520-e525

Tal G, Cesar K, Houry S, Ballin A, Mandelberg A.

Hypertonic saline/epinephrine treatment in hospitalized infants with viral bronchiolitis reduces hospitalizations stay: 2 years experience.

Isr Med Assoc J. 2006;8(3):169–173