

Metforminbehandling akut sjuka patienter, gällande rutin

Syfte

Minimera risken för utveckling av laktacidosis hos diabetespatienter med Metforminbehandling och pågående akuta sjukdomssymtom

Omfattning

IVAK och Medicin-Rehab kliniken, Kalix Sjukhus.

Bakgrund

T. Metformin är förstahandsbehandling vid diabetes typ 2. En känd allvarlig biverkan till metforminbehandling är utveckling av laktacidosis (metformin ackumuleras och orsakar laktatstegring) vilket kan ske redan vid lätt sänkt njurfunktion. De flesta fall rapporteras i kombination med annan allvarlig sjukdom med risk för intorkning.

Manifest laktacidosis är ett tillstånd med hög mortalitet.

Rutinbeskrivning

I samband med akut omhändertagande ordinerar ansvarig läkare tillfälligt uppehåll med behandling T. Metformin och kombinationspreparat innehållande metformin. Detta gäller för samtliga patienter aktuella för

1. Vård på akutvårdsplats IVAK.
2. Inläggning IVA.
3. Inläggning vårdavdelning
4. Akut/subakut DT-undersökning **med kontrast** utan inläggningsbehov.

Blodsockervärden följs regelbundet och vid behov ersätts T.Metforminbehandling i akutskedet med inj. Novorapid sc i adekvat dos, se delegationsschema.