

## CELLCEPT / MYKOFENOLSyra

<b>Vad är Cellcept?</b>	Cellcept är ett läkemedel som under senare år använts inom transplantationsmedicin för att förhindra avstötning av transplanterade organ. Läkemedlet har en immundämpande effekt genom att förhindra celledelning av en viss typ av vita blodkroppar, så kallade lymfocyter, vilket också är önskvärt vid vissa reumatiska sjukdomar, bland annat SLE och vaskuliter. Cellcept är inflammationsdämpande och påverkar sjukdomens inflammatoriska aktivitet.
<b>Hur lång tid tar det innan Cellcept ger effekt?</b>	Det kan ta 2-4 månader innan man ser effekt.
<b>Hur många tabletter skall jag ta varje dag?</b>	Behandlingen startas i regel med 500 mg/dygn den första veckan och därefter sker en ökning med 500 mg/vecka till önskad måldos, 1500-3000 mg/dygn. <b>Kapslarna ska inte öppnas och tabletterna inte krossas</b> då beredningen inte får inandas eller komma i kontakt med hud och slemhinnor. Cellcept kan intas med eller utan föda.
<b>Har Cellcept några biverkningar?</b>	Illamående, förstoppning eller diarré, feber och muskelvärk, blåsor i munnen, påverkan på blodbildning, bältros, ökad risk för infektioner, depression, ångest kan förekomma. Det föreligger ökad risk för hudtumörer vid behandling med Cellcept varför <b>extra försiktighet med solning rekommenderas</b> . Om biverkningar skulle uppträda kontakta Reumatologmottagningen alternativt Din Hälsocentral.
<b>Hur ofta behöver jag lämna kontrollblod prover när jag behandlas med Cellcept?</b>	<b>Du lämnar blodprover på din hälsocentral</b> varannan vecka i tre månader sedan var 4:e vecka i 3 mån sedan var 8:e vecka i 6 månader därefter var 3:e månad. Blodprovremiss är upplagd i datorn så personalen på din hälsocentral ser vilka prover som skall tas. Däremot måste Du själv ha kontroll på hur ofta prover skall lämnas och <b>boka provtagningsstid</b> . <b>Receptförnyelse sker endast om provtagningsföreskriften följs. Är proverna bra hör du inget från oss.</b>
<b>Kan jag ta andra läkemedel tillsammans med Cellcept?</b>	Det är viktigt att Du informerar Din läkare om vilka mediciner Du tar. Du kan fortsätta med Din andra medicinering så länge som Din reumatolog inte säger något annat.
<b>Hur gör jag med Cellcept när jag får en infektion?</b>	Ökad risk för infektioner finns, det är viktigt att du gör uppehåll med medicinen om du får infektionssymtom och vänd Dig till din hälsocentral vid behov. Om Du äter antibiotika/penicillin skall Du också göra ett uppehåll med Cellcept.
<b>Hur gör jag med Cellcept inför en operation?</b>	Du kan fortsätta med Cellcept både innan och efter operation. <b>Läkare kommer att informera Dig om annat gäller.</b>
<b>Kan jag ta Cellcept under graviditet och amning?</b>	Nej. Både män och kvinnor skall använda <b>dubbelt</b> preventivmedel under behandlingen. För kvinnor uppehåll med Cellcept sex veckor innan planerad graviditet samt under amning. För män gäller skydd i minst 3 månader efter avslutad behandling innan planerad graviditet.
<b>Vid frågor kontakta</b>	Mottagningssköterskan via tel. <b>0920-28 39 90</b> alternativt via internet <b>1177.se</b> , nås även via <a href="http://www.norrboten.se">www.norrboten.se</a>

Huvudprocess Reumatologiska och immunologiska sjukdomar	Ansvarig Karin Lindmark	Processledare Hanna Larsson	Sida 1 av 1
Dokumenttyp Patientinformation	Dokument-Id VARD-5-2225	Godkänt datum 2025-01-10	Version 7.0